



BIBLIOTECA NAZ.

• Vittorio Emanuele III


XXIX

B

65

NAPOLI





MEMOIRES

POUR SERVIR

A L'HISTOIRE

D'UN GENRE DE

POLYPTES.

TOME SECOND.



7-

MEMOIRES

POUR SERVIR

A L'HISTOIRE

D'UN GENRE DE

POLYPES

D'EAU DOUCE, A BRAS

en forme de cornes.

*Par M. TREMBLEY, de la Société
Royale de Londres, &c.*

TOME SECOND.



PARIS;

Chez DURAND, rue Saint Jacques,
à S. Landry & au Griffon.

M. DCC. XLIV.

Avec Approbation & Privilège du Roi.





M É M O I R E S
POUR L'HISTOIRE
D E S
P O L Y P E S.

TROISIEME MEMOIRE.

De la génération des Polypes.

A PRES m'être assuré que
les Polypes d'eau douce ,
dont il est question dans
ces Mémoires , pouvoient se multi-
plier par la section , je fus extreme-
ment curieux de connoître la ma-

Tome II.

A

niere dont ils se multiplient naturellement. Je doutois encore dans ce tems-là, si les Polypes étoient des plantes, ou des animaux, & je me flatois même, comme je l'ai dit, que leur maniere naturelle de se multiplier, me fourniroit un caractère distinctif, & propre à me tirer du doute où j'étois.

ON voit dans les Lettres de Leeuwenhoek, & de l'Anonyme Anglois, imprimées dans les *Transactions Philosophiques* pour l'année 1703. que les premiers, & à ce qu'il paroît, les seuls Polypes que ces deux Naturalistes aient observés, étoient en train de multiplier lorsqu'ils les ont trouvés. Quelque nouveau que fût pour eux le fait singulier que leur présentoit cette multiplication des Polypes, ils ne s'y tromperent point;

& frappés par cette merveille , ils donnerent toute leur attention aux progrès des jeunes Polypes , jusqu'à ce qu'ils fussent parfaits , & qu'ils se fussent séparés de leur mere.

J'IGNOROIS la découverte de ces deux Naturalistes , lorsque le hasard me présenta les Polypes , & je ne reconnus pas d'abord leurs petits pour ce qu'ils étoient. Il y avoit cependant plusieurs Polypes parmi les premiers que j'ai découverts , qui produisoient des petits. Je m'étois peu arrêté à les considérer , ne m'étant point encore proposé d'observer de suite des Polypes ; & lorsque je me mis à les étudier avec soin , il ne s'en trouva plus dans mon verre qui fussent en train de multiplier.

CE fut dans le mois de Décembre 1740. que je commençai à chercher

A ij

4 MEM. POUR L'HISTOIRE

quelle étoit la maniere naturelle de multiplier des Polypes. Je n'apperçus rien pendant ce mois-là, pendant celui de Janvier, & une partie de Fevrier 1741. qui me donnât lieu de me flater que je parviendrois à satisfaire ma curiosité sur cet article. C'est sur quoi je ne pouvois gueres compter en Hiver : mais j'attendois avec impatience le tems favorable à la végétation des plantes, & à la multiplication des animaux. Celui où je devois trouver ce que je cherchois, arriva même plutôt que je ne l'espérois. Le 25. Fevrier, j'observois avec une loupe un Polype verd, qui étoit fixé sur le côté du verre, dans lequel je tenois tous ceux qui n'étoient pas employés à quelque expérience particuliere. J'apperçus sur son corps une petite ex-

BES POLYPES. III. Mém. 5

erescence d'un verd foncé. Quelque petite que fût cette excrescence, elle attira toute mon attention, parce que je n'avois jamais rien vu de pareil sur aucun Polype, quoique j'en eusse déjà observé un assez grand nombre. Le Polype sur lequel elle étoit, fut dès ce moment très-précieux pour moi; & de peur de le confondre avec plusieurs autres qui étoient dans le même verre, je l'en tirai, & je le mis à part dans un autre. Il s'attacha contre le côté du verre, & par bonheur il se plaça de maniere que je pouvois facilement observer, avec une forte loupe, l'excrescence qui paroissoit sur son corps. Dès le jour même que je la découvris, après l'avoir considérée à plusieurs reprises, je trouvai quelque rapport entre sa structure, & celle.

du Polype dont elle sortoit. Je ne pouvois , à la vérité , fonder sur un rapport aussi incertain , aucune décision assurée. Mais je commençai à soupçonner que cette excrescence deviendrait un Polype. L'idée de ces Polypes que j'avois vus l'Été précédent , fixés les uns sur les autres , me revint à l'esprit. C'est sur-tout ce qui me fit penser que l'excrescence que j'observois , étoit un jeune Polype qui sortoit d'un autre. Je cessai mes observations du 25. Février à dix heures & demie du soir , non sans impatience de revoir ce Polype qui m'avoit occupé une partie de cette journée.

J'EUS le lendemain matin le plaisir de voir que son excrescence étoit augmentée en longueur ; elle avoit environ un quart de ligne de long.

DES POLYPES. III. Mém. 7

Elle étoit à peu près cylindrique , & située perpendiculairement sur le Polype. Elle augmenta fenfiblement le 26. & le 27. Le 28. elle avoit pour le moins une demi-ligne de longueur. Lorsque je faisois contracter le Polype , elle se contractoit auffi. Enfin , tout conſpiroit à me perfuader que cette excrcſcence étoit un jeune Polype , & il ne me manquoit plus pour en être aſſuré , que de voir ſortir de ſon ſommet ces fils déliés , que j'ai nommés les piés & les bras des Polypes. Je les cherchois continuellement ; & ce jour même , vingt-huitieme Fevrier , à dix heures du ſoir , j'en apperçus quatre qui commençoient à pouſſer. Ce ne fut pas ſans un ſenſible plaifir que je les apperçus , ni ſans une extreme curioſité de voir la fin d'un phénomène ſi nouveau

A iiij

8 *MEM. POUR L'HISTOIRE.*

pour moi. Les jours suivans, les quatre bras du jeune Polype s'allongerent, & il parut un cinquieme. Le Polype même croissoit sensiblement. Je l'ai vu lorsqu'il tenoit encore à sa mere, s'étendre pour le moins jusqu'à la longueur de trois lignes. Il s'en est séparé le dix-huitieme Mars, entre dix & onze heures du matin.

AVANT que ce jeune se fût séparé de sa mere, j'en vis d'autres qui sortoient aussi de quelques-uns des Polypes qui vivoient ensemble dans mon grand verre.

* 1741. JE trouvai dans le mois d'Avril * ; la seconde espece de Polypes, dont j'ai parlé dans les Mémoires précédens ; & le premier de cette espece que je vis, avoit cinq petits, qui sortoient à la fois de son corps. Ceux de l'espece à longs bras, en produi-

soient aussi quand je les découvris : & les observations suivies que j'ai faites sur les uns & sur les autres , m'ont prouvé qu'ils multiplioient tous de la même manière.

COMME les Polypes de la seconde & de la troisième espèce , sont beaucoup plus grands que les Polypes verts , il est plus facile d'observer les progrès des jeunes qu'ils produisent. C'est aussi sur ces deux espèces que j'ai souvent répété les observations que j'ai d'abord faites sur l'autre.

LORSQU'UN jeune Polype commence à pousser , on ne voit d'abord qu'une petite excrescence , qui ordinairement se termine en pointe *.

Elle a à peu près la figure d'un cône , mais d'un cône dont la base est grande à proportion de sa hauteur. La

* Pl.
VIII.
Fig. 1. c.

couleur de cette excrescence , de ce petit bouton , est d'ordinaire plus foncée que celle du corps de la mere. Peu à peu ce bouton s'élève davantage , & à mesure qu'il s'allonge il forme un cone dont la base devient plus petite , à mesure qu'il augmente en hauteur. Ce cone est souvent mal formé , sa pointe est arrondie , ou bien il paroît tronqué. Quelques degrés d'accroissement de plus , font enfin perdre au jeune Polype la forme conique : il devient à peu près cylindrique ; & c'est alors , ou environ ce tems-là , que les bras commencent à pousser à son extrémité antérieure *. Ce jeune Polype ne conserve pas long-tems la figure d'un cylindre , son bout postérieur par lequel il tient à sa mere , s'étrécit peu à peu , il s'étrangle , & enfin il

* Pl.
viii.
Fig. 1. c.
i.

DES POLYPPES. III. Mém. II

ne paroît la toucher que par un point *. Le jeune Polype , qui dans ^{* Fig. 1.} ses commencemens étoit beaucoup ^{b.} plus large à son bout postérieur , n'est nulle part si mince après qu'il est formé.

QUAND le jeune Polype n'est pas fort avancé , & que son bout postérieur est peu ou point étranglé , il reste toujours dans la même situation à l'égard du corps de sa mere ; il conserve la même direction avec laquelle il en est sorti , qui est le plus souvent perpendiculaire ; mais quelquefois plus ou moins oblique. Lorsque l'étranglement est déjà considérable , & que le jeune Polype tient moins à sa mere , il ne garde plus une situation fixe , il varie son inclinaison sur le corps de la mere. Si ce jeune ne se soutenoit pas par sa

propre force , il pendroit alors en bas : mais on voit clairement qu'il se soutient par lui-même , & qu'il exécute pour varier la direction de son corps , tous les mouvemens que fait un Polype fixé contre les parois d'un verre.

LE Polype est prêt à se séparer de sa mere , lorsqu'il ne lui est plus attaché que par un point *. Il est assez facile de s'imaginer comment cette séparation se fait : mais j'ai voulu la voir ; & à force d'en épier le moment , je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai vu de jeunes Polypes , des trois especes que je connois , se séparer de leurs meres. Ils se séparent tous de la même maniere. La mere & le jeune s'attachent au verre , ou aux autres corps sur lesquels ils se trouvent ; avec leurs bras , & même avec leur

* Fig. 2.
a. b.

tête. Ce sont-là les préparatifs que font les Polypes pour se séparer. Il ne s'agit plus, pour en venir à bout, que de faire un effort; & il n'est pas nécessaire qu'il soit considérable. C'est quelquefois la mere qui fait cet effort; d'autres fois le jeune, & souvent tous deux. On conçoit aisément que les Polypes étant susceptibles d'un grand nombre de degrés de contraction, d'extension, & d'inflexion; & pouvant se cramponner contre les corps, dans la plupart des attitudes très-variées, qu'ils peuvent prendre: on conçoit, dis-je, que les meres & les jeunes ne se mettent pas toujours précisément dans la même situation, quand ils se préparent à se séparer. Au contraire, elle varie beaucoup: mais dans le fond, l'opération dont il s'agit, re-

1. MEM. POUR L'HISTOIRE

vient toujours à l'idée générale que j'en ai donnée. Je me contenterai de décrire un seul cas particulier.

- * Pl.
viii. UN Polype * qui avoit un petit ;
Fig. 3. a. prêt à se séparer * , disposa son corps
b. en arc de cercle * , & attachas ses
* c d. deux extrémités * contre le côté du
* a d b. poudrier. Le jeune tenoit au haut de
* d. cet arc * , & sa tête † étoit fixée
† c. contre le verre. La mere ne fit que
contracter un peu son corps , qui
* Fig. 4. par-là devint la corde * de cet arc
a b. de cercle qu'il formoit auparavant.
Ses deux extrémités resterent attachées contre le verre. Le jeune , qui étoit cramponné contre le verre avec ses bras , ne suivit point la mere lorsqu'elle se retira. Il resta à sa place ,
* d. son bout postérieur * se détacha du
* a b. corps de la mere * : ils se séparèrent & se trouverent même d'abord à

quelque distance l'un de l'autre *. * Pl.

J'AI VU cette séparation se faire , VIII.
Fig. 4.

quoique la mere ne fût fixée que par son bout postérieur. Elle s'opere même quand l'un & l'autre bout ne tiennent qu'à la superficie de l'eau : ils y trouvent un appui suffisant pour cela. J'ai souvent hâté la séparation , en donnant un petit coup au jeune Polype , avec le bout d'un pinceau , ou bien en agitant la mere dans l'eau. Ce dernier expédient a suffi une fois pour faire détacher trois petits d'une mere qui en avoit plusieurs. Il m'est arrivé d'engager au bout d'un pinceau les bras d'un jeune Polype , & de le tenir suspendu dans l'eau. Je l'ai ensuite secoué , & avec lui la mere qui pendoit en dessous. Ils se sont alors séparés l'un de l'autre , la mere est tombée au

fond du verre , & le jeune est resté attaché au bout du pinceau.

DES qu'un jeune Polype est séparé de sa mere , il peut marcher , & faire tous les mouvemens dont ces animaux sont susceptibles.

LES bras des jeunes Polypes commencent à pousser , comme je l'ai déjà dit , à peu près lorsque ces jeunes ont pris la forme d'un cylindre *.

* Fig. 1.
r. h.

J'ai dit à peu près , parce que ces bras peuvent cependant sortir plutôt , ou plus tard ; & que les changemens de forme qu'on remarque dans un jeune Polype pendant son accroissement , ne sont pas toujours les mêmes , & ne se succèdent pas toujours avec la même régularité.

IL ne paroît d'abord que quatre ou cinq bras ; & quand ces bras ont déjà fait quelques progrès , il en sort d'autres

DES POLYPTÈRES. III. *Mém.* 17
d'autres dans les intervalles que les
premiers laissent entr'eux.

Tous les Polypes d'une même es-
pece , n'ont pas le même nombre de
bras lorsqu'ils se séparent de leurs
meres. Il en vient encore plus ou
moins aux uns ou aux autres , après
leur séparation.

J'AI déjà dit dans le premier Mé-
moire * , que tous les individus des ^{* Page}
trois especes de Polypes que je con- ^{48.}
nois , n'avoient pas un nombre égal
de bras , & j'ai marqué avec autant
de précision qu'il m'a été possible ,
quelle étoit la différence qu'on trou-
ve dans ces animaux à cet égard.
C'est sur les Polypes de la seconde
espece , que j'ai observé de suite l'ac-
croissement du nombre des bras ;
parce que ce sont ceux que j'ai nour-
ris le plus long-tems. J'ai vu dans

Tome II.

B

* Pl. X.
Fig. 3.

quelques-uns ce nombre augmenter plus d'une année après leur naissance, & parvenir même peu à peu jusqu'à celui de dix-huit * & de vingt. Je n'ai jamais pu trouver dans les fossés, des Polypes qui eussent un si grand nombre de bras, je ne l'ai remarqué que dans ceux que j'ai nourris. J'ai aussi observé quelquefois que le nombre de leurs bras diminuoit.

UN jeune Polype peut se servir de ses bras pour arrêter une proie, avant qu'il soit séparé de sa mere. C'est ce dont il est bien facile de s'assurer. Il suffit de faire tomber un ver, ou quelque autre petit animal, sur de jeunes Polypes, qui tiennent encore à leur mere. On le leur verra saisir, lors même qu'ils n'auront encore que quelques bras, & que ces bras n'auront pas encore pris toute leur croissance.

Cette expérience apprendra en même tems que la bouche des jeunes Polypes est formée avant leur séparation. Ils l'ouvriront pour faire entrer le ver dans leur estomac : en un mot , ils feront tout ce que j'ai décrit , en parlant en général , dans le Mémoire précédent , de la manière dont les Polypes arrêtent leur proie , la portent à la bouche , & l'avalent.

Les jeunes Polypes ne mettent pas toujours le même espace de tems à pousser. On remarque à cet égard beaucoup de variété ; & cela suivant qu'il fait plus ou moins chaud , & suivant la quantité de nourriture que prennent les Polypes. J'ai vu de jeunes Polypes être parfaitement formés au bout de vingt-quatre heures , & d'autres ne l'être qu'au bout de

quinze jours. Les premiers pouffoient dans le fort de l'Été, & les autres dans une saison où l'eau dans laquelle ils étoient, faisoit descendre le Thermometre de Prins au-dessous du quarante-huitieme degré, c'est-à-dire, au-dessous du degré qui marque le tempéré.

LES mêmes circonstances qui font que les jeunes Polypes poussent plus ou moins vite, sont aussi celles qui influent sur la durée de leur union avec leurs meres. Plutôt ils sont formés, plutôt ils sont en état de s'en séparer. Aussi voit-on en Été très-souvent des jeunes qui se détachent de leurs meres, deux jours après avoir commencé à pousser; au lieu qu'il s'écoule quelquefois, en Hiver, cinq ou six semaines avant qu'ils s'en séparent.

Tous les jeunes Polypes ne sont pas également grands, lorsqu'ils se séparent de leurs meres: cela varie, suivant la quantité de nourriture qu'ils ont reçue pendant leur union, & suivant plusieurs circonstances qu'il seroit inutile de spécifier.

IL n'arrive pas régulièrement qu'un jeune Polype se détache de sa mere dès qu'il est bien formé, & que son bout postérieur par lequel il lui est uni, est fort étranglé. Si la mere est fixée quelque part où elle & ses petits soient toujours à portée de saisir autant de proies qu'ils en peuvent manger, leur séparation n'a souvent lieu, dans le tems même le plus chaud; que plusieurs jours après que ces jeunes sont parvenus au point où ils auroient pû se séparer. Mais quand la nourriture manque,

les jeunes Polypes se séparent plutôt. Il est apparent que , pressés par la faim , ils se détachent pour aller chercher ailleurs de quoi la satisfaire.

Je rapporterai bien-tôt mes observations sur le degré de chaleur nécessaire pour faire pousser les jeunes Polypes , & sur la durée de leur union avec leur mere. C'est pourquoi je ne m'étendrai pas davantage ici sur cet article.

• ON pourroit peut-être dire que les jeunes Polypes ne sortent point réellement du corps des vieux ; mais que seulement des œufs , ou des petits Polypes , ont été déposés & fixés sur leur peau , & qu'ils y restent attachés pendant qu'ils croissent. C'est un soupçon que doivent naturellement former ceux qui n'ont pas examiné la chose par eux-mêmes , &

qui peut aussi venir dans l'esprit de ceux qui l'examinent pour la première fois. Mais dès qu'on observe avec attention un jeune Polype à la loupe , & sur-tout lorsqu'on suit ses progrès , on ne peut presque plus douter que la mere ne le pousse hors de son corps , comme un tronc d'arbre pousse une branche. On voit distinctement que cette excrescence , qui est le commencement d'un jeune Polype , n'est qu'une continuation de la peau de la mere ; que cette peau s'est renflée , s'est élevée en cet endroit : & même il n'est pas impossible de voir qu'elle forme déjà un petit tuyau qui communique avec celui que forme la peau de la mere , ou , pour parler autrement , avec son estomac. C'est-là ce que mes premières observations m'ont

appris : mais j'avois trop d'intérêt de m'assurer plus positivement de ce fait , pour m'en tenir-là. Je n'ai donc rien négligé pour faire des expériences plus décisives sur la maniere dont les jeunes Polypes sont unis avec leurs meres.

IL s'agissoit sur-tout de savoir si l'estomac des jeunes Polypes communique avec celui des meres. On doit se rappeler ici ce que j'ai dit de la structure de ces animaux *.

* Pag. 104. Leur corps est percé d'un bout à l'autre : il forme une sorte de tuyau , ou de boyau ; & c'est ce tuyau que j'ai appelé l'estomac des Polypes. Je me proposai donc , pour m'assurer de l'étroite union qui me paroissoit être entre un jeune Polype & sa mere , de chercher si les tuyaux que forment leurs corps , avoient un trou de com-

DES POLYPPES. III. Mém. 25
munication ; si l'estomac du jeune
Polype n'étoit , par rapport à celui
de la mere , que ce que sont certains
vaisseaux du corps humain , qui s'ou-
vrent les uns dans les autres.

LA premiere expérience que je
fis pour parvenir à mon but , fut de
tâcher d'ouvrir un Polype , de ma-
niere que je pusse voir distinctement
le trou de communication , en cas
qu'il y en eût un en effet , entre l'es-
tomac de cette mere , & celui de
son petit. Je choisiss un assez grand
Polype de la seconde espece , duquel
sortoit un jeune , dont le bout posté-
rieur , l'endroit par lequel il tenoit à
la mere , n'avoit pas encore com-
mencé à s'étrangler , afin que s'il y
avoit un trou de communication , il
fût d'autant plus sensible. Je mis ce
Polype dans un peu d'eau dans le

creux de ma main , & je me plaçai de maniere que je pouvois , quand je voulois , éclairer davantage mon objet en l'exposant au Soleil. Ensuite je coupai avec mes ciseaux environ la moitié du corps du jeune Polype. Son estomac fut alors ouvert au bout supérieur de cette partie qui restoit attachée à la mere , il y avoit une ouverture , par laquelle je regardai avec le secours d'une loupe ; & il me sembla qu'en effet cet estomac du jeune Polype , communiquoit avec celui de la mere. Mais je pouvois me faire illusion. Il convenoit , pour que je fusse plus sûr de ce que je voyois , que cet endroit où devoit être la communication , fût davantage éclairé. Je coupai donc le corps de la mere , de côté & d'autre de l'endroit d'où sortoit le jeune Polype.

Il ne resta alors qu'une portion cylindrique fort courte, & ouverte par les deux bouts. Ces deux ouvertures servirent à introduire plus de jour dans la portion qui restoit du corps de la mere ; & par conséquent à éclairer davantage cet endroit où devoit être l'ouverture de communication entr'elle & le jeune. Je regardai de nouveau par le bout supérieur & ouvert de la portion restante du jeune Polype, & je vis très-sensiblement plus de jour à l'endroit où il tenoit à sa mere : il me sembloit même que je voyois dans l'estomac de la mere. Mais il se pouvoit encore qu'il y eût à cet endroit où se joignoient les deux Polypes, une peau qui n'empêchât pas le passage de la lumiere, & qui cependant séparât les deux estomacs. C'est ce qui restoit

à examiner. Ce fut dans ce dessein que je coupai, suivant sa longueur, la portion cylindrique restante de la mere, j'enlevai la moitié opposée à celle dont le jeune sortoit, & je mis par-là tout-à-fait à découvert cet endroit de l'intérieur de l'estomac de la mere, où devoit être le trou de communication avec celui du jeune.

* Pl. Je le vis alors très-distinctement* : &
VIII.
Fig. 5. t. en regardant par ce trou avec le se-

cours d'une loupe, j'apperçus l'ouverture qui étoit au bout de la portion restante du jeune*. Ayant ensuite fait changer de situation à ces deux portions de Polypes ainsi préparées, je regardai par cette dernie-

* Fig. 6. re ouverture*, & je vis très-clairement le jour à travers le trou de
6. communication*. Afin qu'il ne me restât aucun scrupule, je mis ces por-

tions de Polypes dans un petit verre plat , je les observai encore à la loupe avec beaucoup d'attention. Je vis, en les disposant comme elles avoient déjà été disposées sur ma main , le trou de communication que je cherchois , de maniere à n'avoir plus le moindre lieu de douter de sa réalité.

JE ne me suis pas contenté de faire cette expérience une fois : je l'ai entreprise sept fois , & j'ai réussi cinq.

ON ne peut gueres nourrir des Polypes lorsqu'ils poussent des jeunes , sans avoir occasion de remarquer un fait qui démontre cette ouverture de communication qu'il y a entre l'estomac de la mere , & celui de son petit.

Après que la mere a mangé* , on voit le corps des jeunes Polypes qui lui sont attachés , s'enfler , se remplir

* Pl.

VII.

Fig. 7.

a b.

d'alimens, comme s'ils en avoient eux-mêmes pris par la bouche * : & pour peu qu'on les observe, on a tout lieu de juger que ces alimens sont passés de l'estomac de la mere dans le leur, par l'ouverture de communication qui est entr'eux. Mais la preuve devient encore plus parfaite, si l'on peut voir en effet ces alimens passer de l'estomac de la mere, dans celui de ses petits : & c'est ce dont on trouvera l'occasion, pour peu qu'on travaille à se la procurer.

Je nourrissois à part, dans un poudrier, un Polype à longs bras, dont un jeune sortoit environ à une ligne de distance de la tête. Il étoit fixé contre les parois du verre, & il avoit la tête en bas. Au simple coup d'œil, il me parut qu'il y avoit une ouverture de communication très-grande

entre ce Polype & son petit. Le tout que formoient ces deux Polypes, ressembloit à un vaisseau qui se sépare en deux, assez près d'une de ses extrémités. Pour m'assurer plus précisément de ce qui en étoit, je donnai un Mille-piés à dard à la mere, & un autre au jeune Polype. Chacun de ces deux Polypes commença à avaler son Mille-piés : & je les vis d'abord entrer peu à peu, l'un dans la portion de l'estomac de la mere, prise de l'endroit où le jeune sortoit jusqu'à la tête ; & l'autre, dans l'estomac du jeune. Lorsque ces Mille-piés furent parvenus à l'endroit où se faisoit la jonction des deux estomacs, ils passerent tous deux dans la portion communé, c'est-à-dire, dans la partie-postérieure de l'estomac de la mere ; & il ne resta rien

dans les portions d'estomac séparées; savoir, dans celui du jeune, & dans la portion de celui de la mere, prise de l'endroit où le jeune sortoit jusqu'à la tête. C'est dans l'estomac commun, dans le reste de celui de la mere, que les deux Mille-piés furent digérés, & réduits en une sorte de bouillie. Cette matiere commença alors à être ballottée d'une maniere sensible dans le corps du Polype: elle alloit & venoit de l'estomac commun, dans les portions séparées, & des portions séparées dans l'estomac commun. Quelquefois elle passoit toute dans une de ces portions séparées, & d'autres fois il en passoit une partie dans chacune. J'ai répété très-souvent cette expérience, & avec toute la variété dont elle est susceptible.

APRES

APRES avoir été témoin des faits que je viens de rapporter, il ne m'étoit plus possible de douter le moins du monde, de la communication qu'il y avoit entre une mere Polype & son petit. Il étoit clair que la peau de ce petit, n'est absolument qu'une continuation de celle de la mere, & que les Polypes multiplient véritablement par rejettons, comme nombre de plantes.

IL y a plus, les jeunes Polypes, comme je l'ai déjà indiqué plusieurs fois, ne poussent pas à un seul endroit déterminé. On en voit sortir successivement, & souvent en même tems, de plusieurs endroits : & j'ose même avancer, à l'égard de quelques Polypes que j'ai nourris pendant plus de deux années, qu'il y a peu ou point d'endroits de leur

34 MEM. POUR L'HISTOIRE
corps, dont il ne soit sorti des pe-
tits.

LES jeunes ne sortent pas, dans
les Polypes à longs bras, de la partie
postérieure, de cette espece de
queue que forme leur corps en se ré-
trécissant * : ils ne sortent que de
* Pl. VII l.
Fig. 8. b l'autre partie *. Mais quant aux Po-
* a c. lypes de la seconde espece, je leur
ai vu pousser des jeunes, même très-
près de leur extrémité postérieure.
Cependant il est vrai que cela est
assez rare.

LA seconde expérience que j'ai
* Tome II. rapportée *, pour prouver que l'es-
pag. 29. tomac des jeunes Polypes commu-
nique avec celui des meres, a pu en
même tems faire connoître l'usage
de cette communication. On a vu
que le suc nourricier, extrait des ali-
mens dans l'estomac de la mere Po-

lype, étoit porté dans l'estomac du jeune. C'est à quoi sert ce mouvement qui se fait quelquefois remarquer dans les Polypes, & dont j'ai prouvé la réalité dans le Mémoire précédent *. J'y ai fait voir que ce mouvement sert à répandre le suc ^{* Tome I. pag. 254} nourricier dans tout l'estomac, & même à le conduire dans les bras, d'où il est ensuite renvoyé dans le corps.

IL étoit bien vraisemblable que les alimens digérés dans l'estomac d'une mere Polype, & passés ensuite dans l'estomac de ses petits, servoient à les nourrir. Mais j'ai cherché à avoir une démonstration parfaite de cette vérité, & elle n'a pas été difficile à trouver.

J'AI donné à diverses meres Polypes de ces alimens d'une couleur

bien marquée , dont je me suis servi pour faire les expériences rapportées dans le second Mémoire , de ces vers plats dont les intestins sont pleins

*Pl. VII. d'une matiere rouge *. Une partie
Fig. 7. des alimens rouges a passé dans l'estomac des jeunes Polypes , & ils ont pris , comme leur mere , une couleur rouge : ce qui prouve que ces alimens ont servi à les nourrir , ainsi qu'on en peut juger par ce qui a été

* Tome I. dit ci-dessus *.

pag. 264.

IL n'est pas étonnant que des animaux qui sont encore unis à leur mere , tirent d'elle leur nourriture. C'est ce qu'un grand nombre d'expériences nous ont appris depuis long-tems. Mais les Polypes nous font voir plus que cela ; savoir , des petits qui nourrissent leur mere lorsqu'ils lui sont encore unis , comme la mere

elle-même les nourrit.

Ces petits, comme je l'ai déjà dit, faisoient des proies, les avalent, & les digèrent, avant que de se séparer de leur mere. Les alimens passent ensuite, après la digestion, de leur estomac dans celui de la mere, de la même maniere que ceux que la mere a pris, passent dans l'estomac des jeunes. C'est ce que j'ai vu très-souvent; & l'on juge bien que je n'ai pas négligé de donner à plusieurs petits, pendant leur union avec leur mere, des alimens rouges ou noirs. Le succès a été tel que j'avois lieu de l'attendre : les meres ont pris la couleur des alimens que les jeunes avoient mangés ; elles ont été nourries par leurs petits.

QUAND les Polypes sont placés dans des endroits où les insectes qui

leur servent de nourriture, abondent, les meres & les petits dévorent souvent, en même tems, plusieurs proies qu'ils ont attrapées; & ces alimens, qui se trouvent d'abord à part dans leur estomac, se mêlent ensuite lorsqu'ils sont réduits en substance liquide, ou en bouillie. C'est ce qu'il est facile de voir, en donnant, par exemple, à une mere un ver à entrailles rouges, & au jeune un morceau de limace noire. On découvre quelque tems après du suc rouge dans l'estomac du jeune, & du suc noir dans celui de la mere. J'ai même vu chacune de ces matieres noire & rouge, passer d'un estomac dans l'autre. D'abord elles étoient bien distinctes : mais à force d'être portées & reportées de part & d'autre, elles se mêloient, & formoient

un tout d'une couleur mêlée de noir & de rouge ; & c'est la couleur qu'avoient la mere & le jeune , après que la nutrition étoit achevée. Ce qui prouve clairement que la mere & le jeune profitent en commun des alimens que chacun prend en particulier.

J'AI fait voir qu'un jeune Polype nourrit sa mere : je dois encore ajouter que si elle porte en même tems d'autres jeunes , ce premier peut aussi les nourrir. Le suc nourricier qu'il a tiré des alimens qu'il a pris , après être passé de son estomac dans celui de la mere , est ensuite répandu dans celui des autres jeunes. Cette mere , avec ses petits , peut être considérée comme un vaisseau qui a plusieurs branches , qui ont toutes entre elles une libre communication. Aussi

lorsqu'on donne à un seul petit des alimens de couleur rouge , par exemple , on voit bientôt les autres se remplir du suc qui en a été extrait , & prendre ensuite , de même que la mere , & le petit qui a mangé pour tous , une teinte de rouge plus ou moins forte , suivant que le suc a été plus ou moins abondant.

A mesure que l'extrémité postérieure , celle par laquelle un jeune Polype est attaché à sa mere , s'étrangle , le trou de communication qui est entre leurs estomacs , diminue , & enfin il se ferme , & la communication cesse. Pour juger de la durée de la communication qu'il y a entre l'estomac d'une mere & celui de son petit , j'en ai nourri de suite ; & chaque fois que j'ai donné à manger à la mere ou au petit , j'ai eu soin

d'examiner avec attention , si le suc passoit encore d'un estomac dans l'autre. Dans les commencemens , des fragmens des alimens alloient & venoient de l'estomac de la mere , dans celui du jeune Polype , & de l'estomac du jeune dans celui de la mere. Ensuite l'ouverture de communication étant devenue plus petite , il n'y avoit plus que le suc tout seul qui pût se communiquer ; & enfin , j'ai remarqué plusieurs fois , en donnant des alimens rouges à la mere , ou à son petit , qu'il ne passoit de l'un dans l'autre aucune partie sensible de ce suc , très-facile à apercevoir à cause de la vivacité de sa couleur ; ce qui prouve que l'ouverture de communication étoit alors fermée ; à savoir , le trou qui étoit dans la peau de la mere.

J'AI fait avec succès les expériences dont je viens de parler , sur les Polypes de la seconde & de la troisième espece.

Au reste , ces expériences ne réussissent pas toujours à souhait. Les Polypes ne prennent pas toujours également bien les alimens qu'on leur offre : ils ne sont pas d'ailleurs toujours placés comme il faut pour être observés commodément avec une loupe. On ne doit donc pas se rebuter pour quelque manque de succès : mais il faut tenter de nouveau ce qui n'a pas réussi. Il est même bon de répéter plusieurs fois les expériences qui réussissent. Tout ce qui se peut voir ne se découvre pas , & souvent ne peut pas être découvert la première fois.

* *Tome I.*
pag. 234.

ON a vu dans le second Mémoire *.

que deux Polypes se disputent la même proie. C'est ce qui arrive même entre une mere & son petit. Elle lui enleve quelquefois des Pucerons ou des Vers, qu'il a commencé à avaler, & elle l'avale lui-même en partie. Le petit, dans l'occasion, fait aussi des efforts pour enlever la proie que sa mere a prise : mais je n'ai jamais vu finir ces combats par la mort de l'un ou de l'autre. Ils se quittent ensuite, sans s'être fait de mal.

J'AI seulement remarqué en général jusqu'à présent, qu'un Polype produit en même tems plusieurs petits : mais je n'ai pas encore indiqué à quel point peut aller la fécondité de ces animaux.

POUR se mettre en état de juger par ses propres yeux de la fécondité

des Polypes , il suffit d'en nourrir de suite quelques uns pendant l'Été. J'en ai même nourri un grand nombre , & j'ai pris beaucoup de précautions en faisant mes expériences , non-seulement parce que je ne voulois rien négliger de ce qui pouvoit contribuer à me donner quelques lumières sur cet article ; mais aussi parce que les Polypes sur lesquels je les ai faites , devoient en même tems servir à d'autres expériences qui demandoient beaucoup d'exactitude. Il me paroît nécessaire d'exposer ici toutes les précautions que j'ai prises ; parce que c'est sur elles que doivent être fondées les preuves des faits que je rapporterai.

J'AI choisi pour sujet des expériences que j'ai faites , de jeunes Polypes nouvellement séparés de leurs

nières ; & je les ai mis en solitude dans des poudriers. Afin de ne courir aucun risque de confondre ces poudriers , j'ai collé un numero sur chacun d'eux , & j'ai marqué le même numero dans le Livre que j'avois préparé pour écrire le journal de mes observations. Les verres dans lesquels étoient ces Polypes solitaires , ont toujours été remplis d'animaux propres à les nourrir. Je me suis servi de ces Pucerons , dont j'ai déjà beaucoup parlé dans le Mémoire précédent *. Il n'y a point de nourriture plus commode. Un Polype dont le poudrier en est bien garni , peut continuellement manger autant qu'il veut ; & c'est ce qui étoit nécessaire pour le succès de mes observations. J'ai eu le bonheur de trouver sans interruption , pendant plus de

* *Tom. I.*
pag. 192.

fix semaines , autant de ces Pucerons que j'en ai eu besoin. Tous les deux jours j'en donnois de nouveaux à mes Polypes , avec de nouvelle eau ; & je nettoyois leurs verres quand cela étoit nécessaire. C'est un soin que j'ai toujours pris moi - même , parce que j'ai voulu pouvoir être parfaitement sûr que chaque Polype avoit bien été remis dans son verre. J'ai pris toutes les précautions possibles , pour ne pas me tromper à cet égard. Deux fois par jour j'ai visité mes verres , j'ai examiné avec attention le Polype que chacun contenoit , & j'ai marqué dans mon Journal ce que j'ai observé.

ENTRE le premier & le 10. Juin 1741. j'ai mis en solitude vingt Polypes de la seconde espece ; & entre le 20. & le 23. du même mois , j'y en

ai mis quatorze de la troisième. En peu de jours il en est mort trois des vingt de la seconde espèce, & onze des quatorze de la troisième. J'en avois mis plusieurs en solitude, afin que mes observations ne fussent pas interrompues par la mort de quelques Polypes. L'expérience me prouva que cette précaution étoit nécessaire.

J'AI marqué avec soin dans mon Journal, l'ordre de la naissance des petits qu'ont produit mes Polypes solitaires, le jour auquel chaque petit a commencé à pousser, & celui dans lequel il s'est séparé. Dès que je trouvois un jeune Polype séparé, je l'ôtois du verre de sa mère; & s'il étoit choisi pour un de ceux de cette génération, sur laquelle je voulois faire les mêmes expériences que sur

la génération précédente , je le mettois aussi en solitude , & je l'observois avec les mêmes précautions. Vingt jeunes Polypes de la seconde espece , & huit de la troisieme , provenus de ceux de la premiere génération des solitaires , ont aussi été mis , chacun à part , dans des verres. J'ai continué à en mettre en solitude de génération en génération , jusqu'à la sixieme. J'ai écrit dans mon Journal , à l'article de chaque jeune , de quel Polype ce jeune étoit né , le jour auquel il avoit commencé à pousser , & celui de sa séparation.

IL me suffira d'insérer ici un article de mon Journal. J'ai choisi celui d'un Polype , qui tient à peu près le milieu pour la fécondité , entre plusieurs autres que j'ai observés. C'est un Polype de la seconde espece , &

un

un de ceux de la troisième génération, qui ont été nourris en solitude. Il a commencé à sortir de sa mère le 5. Juillet, il s'en est séparé le 10. & alors il avoit déjà un jeune, qui depuis le jour précédent, avoit commencé à pousser.

<i>Jeunes Polypes.</i>	<i>Jour auquel ils ont commencé à pousser.</i>	<i>Jour de leur sé- paration d'avec leur mère.</i>
----------------------------	--	--

Le 1 ^{er} jeune a	Juillet.	Juillet
commencé à		
pousser le .	9	Il s'est séparé le 13
2 jeune . . .	11	15
3	12	17
4	13	17
5	13	22
6	16	22
7	17	23
8	18	24
9	22	25
10	22	26
11	23	26

Tome II.

D

50 MEM. POUR L'HISTOIRE

	Juillet.	Juillet.
12	jeune. a poussé le 25	séparé le 27
13	 26	 29
14	 27	 30
15	 29	 --
16	 30	 --
17	 --	 Août.
18	 --	 19
19	 --	 11

Août.

20	 9	 13
21	 11	 14
22	 12	 15
23	 13	 17
24	 14	 17
25	 14	 18
26	 15	 20
27	 16	 20
28	 17	 21
29	 18	 22
30	 18	 23
31	 20	 23
32	 20	 24
33	 21	 25

	Août.	Août.
34	jeune. a poussé le 21.	séparé le 26
35	 23	 27
36	 23	 28
37	 24	 28
38	 26	 30
39	 27	 31
40	 28	 1. Sept.
41	 29	 2
42	 29	 2
43	 31	 4
	Septembre.	
44	 1	 —
45	 4	 —

Je n'ai pas marqué les jours auxquels les jeunes, 17. 18. & 19. ont commencé à pousser, ni de ceux la séparation des jeunes, 15. 16. & 17. Quelques distractions m'ont empêché ces jours-là de faire mes observations avec soin.

CETTE Table dont il s'agit, nous
D ij

apprend que le Polype a produit 45 petits dans l'espace de deux mois ; c'est-à-dire , environ 20. par mois. Entre tous les Polypes que j'ai nourris & observés de la même manière que celui-là , il y en a , comme je l'ai déjà dit , qui ont plus multiplié , & d'autres moins. J'ai trouvé que le nombre mitoyen entre ces deux extrémités , étoit de 20 jeunes par mois.

Il est facile , en examinant cette Table , de déterminer à peu près la durée de l'union des jeunes Polypes avec leurs meres. On voit qu'elle va ordinairement à trois ou quatre jours. Mais à la vérité les Polypes ne sont si peu de tems à parvenir au point où ils peuvent se séparer de leurs meres , que dans l'Été.

Pour se former une idée de la fé-

condité des Polypes , il ne suffit pas de savoir , qu'un seul en peut produire une vingtaine dans un mois. Cela ne seroit rien , si leurs générations ne se succédoient pas très-promptement. Quand je commençai à nourrir des Polypes en solitude , je ne connoissois pas encore leur fécondité. C'étoit alors le milieu de Juin , & je craignois de m'y être pris trop tard , pour pouvoir observer au moins quelques générations de suite. Mais ma curiosité fut bientôt satisfaite au-delà de mes espérances. Au bout d'un mois , j'avois déjà dans mon Journal, des observations sur six générations successives de Polypes. Ces observations m'ont appris qu'un jeune Polype peut , quatre ou cinq jours après qu'il a commencé à sortir de sa mere , avoir lui-même un

jeune qui commence à pousser, c'est-à-dire, qu'on peut voir tous les quatre ou cinq jours une nouvelle génération de Polypes. Ainsi pour juger de la quantité des Polypes qui pourroient venir d'un seul, au bout de deux mois, par exemple, il faut poser d'abord que ce premier Polype en peut produire quarante pendant ce tems : mais outre cela on doit compter que ces quarante commencent chacun à multiplier cinq jours après qu'ils ont commencé à pousser, & qu'ils multiplient aussi sur le pied de vingt par mois. Ce que je dis de cette seconde génération, regarde aussi la troisieme & les suivantes. On comprend facilement, en faisant attention à tout cela, que le nombre des descendans d'un seul Polype, peut, au bout de deux mois, être prodigieux.

J'AI supposé dans ce que je viens de dire, que tous les Polypes produisoient des petits, qu'ils étoient tous meres, & c'est ce que j'aurai bientôt occasion de prouver.

C'EST en faisant les expériences que je viens de rapporter, que j'ai découvert un fait remarquable dont j'ai déjà fait mention en passant, & dont je dois à présent parler plus au long. En considérant de jeunes Polypes qui étoient encore attachés à leurs meres, j'en vis un qui avoit lui-même un petit, lequel commençoit à sortir de son corps; c'est-à-dire, qu'il étoit mere, pendant qu'il étoit encore uni à sa mere. Ce que j'admirai dans ce Polype, fut bientôt commun à plusieurs autres; & j'eus en peu de tems plusieurs jeunes Polypes, encore attachés à leurs meres,

* Pl.
VIII.
Fig. 8.

lesquels avoient déjà trois ou quatre petits , dont quelques-uns étoient même parfaitement formés * : ils pêchoient des Pucerons comme les autres , & ils les mangeoient. Ce n'est pas tout : j'ai même vu une mere Polype qui portoit sa troisieme génération. Du petit qu'elle produisoit , sortoit un autre petit , & de celui-ci un troisieme.

LORSQUE l'on considere une mere chargée de petits , il faut , pour croire que c'est un animal qui multiplie , en être bien convaincu d'avance. On la prendroit plutôt pour une plante , ou pour une racine , qui est extreme-

* Fig. 8. ment ramifiée *.

JE ne décrirai qu'une de ces meres , entre tant d'autres que j'ai eu occasion d'observer. C'est celle qui est représentée dans la Figure 8. de la

Planche VIII. Elle fournira en même tems un exemple de la promptitude avec laquelle les Polypes croissent & multiplient.

C'EST d'un Polype à longs bras dont il s'agit. Quinze jours après avoir commencé à sortir de sa mere , & neuf jours après s'en être séparé , il avoit pour le moins , lorsqu'il étoit bien étendu , un pouce & un quart de longueur. Dix jeunes sortoient en même tems de son corps , & quatre à cinq de ces jeunes étoient longs d'environ sept à huit lignes. Il y en avoit huit d'entr'eux qui étoient parfaitement formés , & en état de manger. De plus , cinq de ces derniers produisoient des petits. De l'un de ces cinq il en sortoit trois , de deux autres il en sortoit deux , & enfin les deux derniers en pouissoient

chacun un. Quelques-uns des Polypes de cette seconde génération, avoient déjà des bras, & prenoient même des Pucerons. Tout le groupe formé par cette mere, & par ses dix-neuf petits, avoit pour le moins un pouce & un quart de long, & un pouce de large. Les bras de la mere, de même que ceux de ses petits, pendoient pour la plupart vers le fond du poudrier.

IL ne s'étoit séparé qu'un jeune Polype de cette mere, depuis qu'elle avoit commencé à multiplier. C'est ce qui a fait qu'au bout de quinze jours elle s'est trouvée si garnie de petits. Elle a toujours été suspendue à la superficie de l'eau, & le verre dans lequel elle étoit, a toujours été bien rempli de Pucerons; deux circonstances très-propres à prévenir

la trop prompte séparation des petits, & par conséquent à se procurer le spectacle de ces Polypes si garnis de jeunes.

ON a déjà pu facilement comprendre, par ce que j'ai dit jusqu'à présent, que les Polypes ne multiplient jamais tant, que lorsqu'ils ont une abondante nourriture, & qu'il fait chaud. Ces deux circonstances doivent absolument être réunies, pour que les Polypes puissent multiplier au point que j'ai décrit ci-dessus. Une abondante nourriture devient inutile à ces animaux dès qu'il ne fait pas chaud, parce que, comme je l'ai fait voir dans le Mémoire précédent *, * *Tom. I.* le degré d'appétit des Polypes est ^{pag. 239.} & ^{240.} proportionné à celui de la chaleur de l'eau dans laquelle ils sont.

POUR se convaincre que les Po-

types multiplient à proportion de la quantité d'alimens qu'ils prennent, il suffit d'en faire jeuner & manger alternativement pendant quelque tems. C'est une expérience qu'on est même quelquefois obligé de faire malgré soi. Les animaux propres à nourrir les Polypes, peuvent devenir rares ; & on peut même en manquer tout-à-fait. C'est ce que j'ai éprouvé, & sur-tout dans les commencemens de mes recherches, lorsque je n'étois pas exercé à trouver toutes sortes d'alimens convenables aux Polypes. Dans ce tems de disette, mes Polypes devenoient plus petits, & cessoient de multiplier : mais ensuite, dès que je leur fournissois de la nourriture, j'avois le plaisir de leur voir produire de nouveaux petits. Je ne m'en suis pas tenu à cette expérience.

DES POLYPTES. III. Mém. 61
générale. J'ai mis un Polype à part
pour le faire jeuner, le 18. Juillet
1741. Quatre petits sortoient alors
de son corps; & il en a poussé en-
core un cinquième. Ces cinq jeunes
ont été séparés le 27. Juillet. Leur
mère a été sans manger jusqu'au sep-
tième Août; & pendant ce tems-là,
elle n'a poussé aucun petit. D'autres
Polypes, au contraire, qui vivoient
dans l'abondance, en pouffoient
tous les jours de nouveaux. Je lui ai
donné des Pucerons le septième
Août; & le neuvième, j'ai vu sortir
un jeune; & depuis elle en a produit
plusieurs. Enfin, je l'ai mise encore
plusieurs fois alternativement dans
l'abondance & dans la disette; &
toujours avec le même succès.

Si l'on ne savoit pas que les jeunes
Polypes peuvent se nourrir eux-mê-

62 . MEM. POUR L'HISTOIRE

mêmes dès qu'ils ont des bras, quoi-
qu'ils soient encore attachés à leur
mere, on auroit de la peine à com-
prendre comment en une quinzaine
de jours, un Polype peut devenir si
grand, & porter dix-neuf petits bien
nourris. Je parle de celui que j'ai dé-
crit tout à l'heure *. Cette mere Po-
lype mangeoit chaque jour environ
une dizaine de Pucerons; & certai-
nement le suc nourricier qu'elle en
tiroit, n'auroit pu suffire à nourrir
tous ses petits. Mais ceux de ces pe-
tits qui étoient en état de manger,
dévoroient par jour entr'eux autout
de vingt Pucerons, dès le dixieme
ou douzieme jour. Ces alimens se
mêloient avec ceux de la mere, com-
me nous l'avons dit ci-dessus *; & le
tout qui en résultoît, se dispersoit
dans tous les jeunes Polypes, au

* Pl.
VIII.
Fig. 8.

* Tome II.
pag. 36.

DES POLYPES. III. Mém. 63
moyen de la communication qui étoit
entre leurs estomacs.

PARMI le grand nombre de Poly-
pes que j'ai pêchés dans les fossés,
dans le tems le plus propre, il ne
s'en est trouvé aucun qui eût plus
de sept petits attachés à la fois à
son corps. Je n'en ai même ren-
contré de pareils, que très - rare-
ment. Cela vient apparemment de ce
qu'il arrive peu souvent que les in-
sectes qui servent de nourriture aux
Polypes, soient en aussi grande quan-
tité dans les endroits où ils vivent,
que dans les poudriers où je tenois
les miens. J'ai vu cependant dans des
fossés & dans un vivier, des endroits
où des Polypes auroient été pendant
long-tems à même de saisir autant de
proies, que ceux que je nourrissois
dans des verres : & c'est ce qui me fit

penſer , après avoir été témoin de la prodigieuſe fécondité des Poly-
pes , qu'en peu de tems , on pourroit
voir des foſſés remplis d'un nombre
infini de ces animaux , quand même
il-n'y en auroit eu que quelques-uns
peu auparavant , pourvu que ces foſſés
fulſſent bien garnis de Pucérons. Ce
n'étoit-là qu'une conjecture , fort
vraiſemblable à la vérité , que je for-
mai au mois d'Août 1741 : mais que
l'expérience juſtifie parfaitement dans
le mois de Juillet de l'année ſui-
vante.

DEPUIS que j'observe les Polypes ,
j'examine de tems en tems les eaux
de Sorgvliet dans leſquelles j'en ai
trouvé : je parcours les bords des
foſſés & d'un vivier , je tire de l'eau
en différens endroits , quelques plan-
tes , ou quelques autres corps ſur
leſquels

lesquels je cherche des Polypes. Je tâche même de les voir dans leur séjour naturel , en prenant pour cela les précautions que j'ai indiquées dans le Mémoire précédent. Lorsque je fis , au commencement de Juillet 1742. la visite des eaux de Sorgvliet ; je trouvai très-peu de Polypes dans le fossé situé aux piés d'une Dune , & qui m'a fourni les premiers Polypes que j'ai vus. Une quinzaine de jours après , j'en parcourus les bords , dans le tems que le Soleil , donnant dans l'eau , éclairoit en divers endroits jusqu'au fond. Je vis d'abord une plante qui étoit plus chargée de Polypes qu'aucune que j'eusse jamais vue. Je la tirai de l'eau avec empressement ; & la regardant comme un trésor , je quittai tout pour la mettre en sureté dans

mon cabinet. Cependant après m'être délecté à l'admirer pendant quelques momens , je revins sur les bords du fossé , & je continuai à les parcourir. Quelle ne fut pas ma joie , lorsque je parvins à un endroit où je vis tout le fond , pour ainsi dire , hérissé de Polypes ! Des branches d'arbres , longues de plusieurs pieds ; qui étoient tombées dans l'eau , en étoient , sans exagération , presque autant garnies qu'une perruque l'est de cheveux. Une planche d'environ dix piés de longueur , qui flotloit sur l'eau , en étoit si parfaitement bordée , qu'on auroit dit qu'elle étoit environnée d'une frange. Je tirai du fossé une des branches , qui étoit extrêmement couverte de Polypes. Quand elle fut hors de l'eau , tous ces Polypes contractés & placés les

uns sur les autres , formoient une glaire épaisse & brunâtre , qu'on n'auroit pas facilement prise pour un amas de Polypes. Je mis dans un grand verre plein d'eau , un morceau de cette branche , où il a été vu par plusieurs personnes. Les Polypes étoient si serrés , qu'on avoit de la peine à découvrir le bois sur lequel ils étoient fixés. Quand leurs bras se furent étendus dans le verre , il en étoit presque entièrement rempli. On peut juger de l'effet que faisoient ces Polypes & leurs bras , par la Figure de la Planche IX. Mais je dois avertir que quelque grand que soit le nombre de Polypes qui sont représentés dans cette Figure fixés sur un morceau de bois , il n'approche pas cependant de celui que j'ai vu sur de pareils morceaux de bois , & sur de

beaucoup plus grands. Je me suis diverti à jeter des vers au milieu de ce nombre prodigieux de bras, qui remplissoient le verre dans lequel étoit cette multitude de Polypes. Un seul de ces vers étoit pris par plusieurs Polypes. En peu de tems il se trouvoit enlacé de mille manieres dans leurs bras.

QUELQUE mêlés que fussent les bras des Polypes qui faisoient la même proie, j'ai remarqué qu'ils se séparoient ensuite ; & j'ai observé pendant plusieurs jours cette multitude de fils déliés, qui se touchoient presque, sans appercevoir aucune con-
 * PL. IX. fusion entr'eux *. Ils faisoient divers mouvemens, ils s'allongeoient & se raccourcissoient, sans s'embarrasser les uns dans les autres.

APRÈS avoir bien examiné tout ce

qui étoit à portée de mes yeux dans le fossé dont il s'agit, je trouvai que les branches d'arbres, & les brins de bois qui étoient dans l'eau, n'étoient nulle part plus garnis de Polyppes, qu'aux endroits qui étoient les plus près de la superficie de l'eau. Il est très-vraisemblable que la plupart de ces animaux avoient été conduits là par le penchant qu'ils ont pour la lumière. C'est l'idée qui me vint, lorsque je remarquai le fait que je viens de rapporter; & je cherchai d'abord à la vérifier par quelque expérience. Je plantai dans le fond de l'eau plusieurs bâtons par un bout, de manière que le bout opposé se terminoit presque à sa superficie. Mon but étoit d'observer si les Polyppes, qui étoient en grand nombre sur le fond du fossé, monteroient le

long de ces bâtons , & s'ils viendroient se placer en quantité à leur extrémité la plus exposée à la lumière. Mais quelques jours après avoir placé ces bâtons de la sorte , le nombre des Polypes diminua fort subitement dans le fossé , comme je le dirai bientôt ; & il me fut par conséquent impossible de voir la fin de l'expérience que j'avois commencée.

IL étoit bien facile de découvrir la cause de cette prodigieuse quantité de Polypes. Le fossé étoit extrêmement peuplé de Pucerons , qui avoient fourni aux premiers Polypes , & aux autres à mesure qu'ils naissent , autant de nourriture qu'il en falloit pour les faire beaucoup multiplier.

JE profitai du peu de tems que ce fossé fut si rempli de Polypes , pour

observer autant qu'il me fut possible , toutes leurs manoeuvres dans leur séjour ordinaire. J'allois chaque jour me coucher sur une planche qui avançoit un peu au-dessus de l'eau , je tenois mes yeux à peu de distance de sa superficie. Je voyois les Polypes marcher , étendre leurs bras , & saisir les animaux qui les touchoient. Il y avoit un grand nombre de Polypes qui étoient suspendus à la superficie de l'eau ; & lorsque le vent l'agitait , je les voyois suivre les vagues : il en passoit des bandes sous mes yeux , qui alloient où le mouvement de l'eau les conduisoit.

Il y avoit alors peu de Limaçons qui n'eussent quelques Polypes sur leur coquille. Ces Polypes n'avoient pas besoin de marcher pour passer d'un lieu dans un autre. Les limaçons.

leur servoient de voiture, & quoiqu'ils cheminent fort lentement, ils faisoient faire cependant aux Polypes en peu de tems plus de chemin qu'ils n'en pourroient faire dans un jour en marchant. D'autres Polypes alloient encore plus vite. C'étoient ceux qui étoient fixés sur les fourreaux de ces jolies Teignes, faits avec de petites pieces de plantes, coupées en quarrés longs, réunies ensemble, & disposées en spirale. Ces teignes nagent assez vite. J'en ai vu qui portoient en nageant plusieurs Polypes attachés à leurs fourreaux *.

* Pl. X.
Fig. 1.

J'AI déjà dit que cette grande quantité de Polypes n'a pas duré long-tems. Huit jours après avoir remarqué des morceaux de bois qui en étoient chargés, je n'y trouvai plus que des restes de Polypes, qui

n'étoient reconnoissables que pour ceux qui en avoient déjà vu périr. Il est fort vraisemblable que les poux dont j'ai déjà parlé , ont beaucoup contribué à la destruction de ces Polypes. Tous ceux que j'ai tirés de l'eau dans ce tems-là , en avoient. J'ai laissé des Polypes dans de grands verres , sans les délivrer de ces animaux ; ils en ont été dévorés pour la plupart.

LES Polypes peuvent , comme je l'ai dit ci-dessus , multiplier dans un tems assez froid. J'en ai trouvé dans les eaux de Sorgyliet au mois de Novembre , de Décembre , & de Mars , qui avoient trois & quatre petits ; & j'en ai eu en même tems dans un cabinet , qui en portoient davantage. Les expériences que j'ai faites , m'ont prouvé clairement que

les Polypes peuvent produire des petits durant toute l'année. J'en ai plusieurs exemples parmi ceux que j'ai nourris pendant long-tems.

CELUI dont il s'agit dans l'Article du Journal que j'ai rapporté ci-dessus *, a, comme on l'a vu, commencé à pousser des jeunes le 9. Juillet 1741, & depuis ce tems-là jusqu'à présent *, il n'a pas cessé d'avoir des petits attachés à son corps. Cependant je l'ai tenu en Hiver dans un cabinet, où le froid ne différoit que de quelques degrés de celui qu'il faisoit dehors ; & je ne l'en ai ôté pour le mettre sur la tablette de ma cheminée que lorsqu'il geloit.

AYANT tenu un régître des naissances des Polypes pendant l'Eté, j'ai été curieux d'en tenir un pendant l'Hiver. J'ai commencé dans l'Au-

* T. II.
P. 49.

* Janvier
1744.

DES POLYPTES. III. Mém. 75
tomne de 1742. & j'ai pris pour sujets de mon expérience deux Polypes de la seconde espece, & deux de celle à longs bras. Mon but n'a pas été de rechercher seulement combien ils produiroient de petits pendant un mois de l'Hiver, mais encore de tâcher d'observer, aussi exactement qu'il me feroit possible, à quel degré de froid ils cesseroient de multiplier, & à quel degré ils recommenceroient. Et comme la quantité d'alimens que prennent les Polypes, influe beaucoup sur le plus ou le moins de petits qu'ils produisent, je me suis encore proposé de marquer les repas qu'ils feroient en Hiver, & de leur en faire faire autant qu'ils pourroient, afin d'acquérir par-là des idées plus complètes sur tout ce qui a rapport à leur multiplication.

POUR faire ces expériences j'ai dû continuellement observer le Thermomètre. J'en ai tenu un dans un des quatre verres où étoient les Polypes que j'observois. Les trois autres verres étoient à côté de celui-là. C'est d'un Thermomètre de Mercure de M. Prins dont je me suis servi. On fait que le trente-deuxieme degré marque le point de congélation, le quarante-huitieme l'air tempéré; le soixante-quatrieme, l'air chaud; & le deux-cent-douzieme, l'eau bouillante. Suivant les Observations que M. l'Abbé Nöllet a faites touchant le rapport de la marche du Thermomètre de M. de Reaumur avec celui de M. Prins, il a déterminé vingt degrés & deux tiers de ce dernier pour dix degrés de celui de M. de Reaumur. Il sera donc facile à ceux qui

voudront rapporter mes Observations au Thermometre de M. de Reaumur, de le faire en se réglant là-dessus.

J'ai ordinairement observé trois fois par jour le Thermometre, le matin, à midi, & le soir, & j'ai rapporté dans le registre à ces différens tems les observations qui y étoient relatives. Il ne m'a pas paru nécessaire d'insérer ici ce registre. Je me contenterai d'indiquer les conséquences qu'on peut tirer des observations qu'il renferme.

LES voici. 1°. Les Polypes peuvent manger lorsque l'eau, dans laquelle ils sont, fait descendre le Thermometre de Prins au trente-cinquieme degré. A la vérité il arrive souvent qu'ils refusent de manger, lorsque l'eau a ce degré de froid. Quand le Thermometre est près du quarantieme degré,

ils peuvent faire un repas tous les deux ou trois jours : mais ce repas n'est pas de la moitié aussi grand que ceux qu'ils font en Été ; & il leur faut deux ou trois jours pour digérer les alimens qu'ils ont pris.

2°. Quelques jeunes Polypes ont commencé à pousser, lorsque le Thermometre étoit au trente-huitieme degré ; mais ils poussent plus fréquemment , quand il est entre le quarante & quarante-sixieme degré de chaleur , qui ne suffiroit pas pour faire pousser la plupart des Plantes qu'on cultive dans nos jardins.

3°. Il paroît encore par ce registre que la plupart des jeunes Polypes restent dans le tems froid , environ un mois , unis à leurs meres : non qu'il leur faille tout ce tems-là pour être en état de s'en séparer , mais parce

qu'ils sont alors moins vifs , & que n'étant pas pressés par la faim , ils ne sont pas excités à changer de place pour aller chercher des alimens.

AVANT que d'avoir fait toutes les observations que je viens de rapporter sur la fécondité des Polypes , & sur l'influence qu'a sur cette fécondité la quantité d'alimens qu'ils prennent , & le degré de chaleur dans lequel ils vivent , j'avois déjà cherché à découvrir comment ils étoient fécondés.

JE continuai ces recherches , en faisant les observations dont il a été question ci-dessus ; & comme ce que j'avois découvert sur la génération des Polypes , avoit même plus de rapport avec ce que nous connoissons dans plusieurs Plantes , qu'avec ce que nous connoissons dans un grand

nombre d'animaux , je pensai , en tâchant d'épier les amours des Polypes, non seulement à voir si elles avoient du rapport avec celles des animaux, mais même avec celles des Plantes.

Le premier fait dont je me suis assuré , c'est que tous les Polypes à bras en forme de cornes, sont meres, que tous les individus de l'espece produisent des petits. La plupart de ceux que je trouvai d'abord dans les fossés, ne pouffoient pas des jeunes ; mais après que je leur eus fait faire quelques repas dans les poudriers où je les mis en grande quantité , il n'y en eut aucun qui ne commençât à multiplier. C'est ce qui me fit penser que peut-être tous les Polypes étoient meres : & pour juger avec plus de sûreté de ce qui en étoit , je donnai une très-grande attention à un
nombre

nombre considérable de Polypes que je nourrissois, & sur lesquels je faisois diverses expériences. Il n'y en eut en effet aucun qui ne se mît à pousser des petits, après avoir mangé plus ou moins : en sorte que je n'eus dès lors plus lieu de douter que le soupçon que j'avois formé, ne fût fondé.

J'AI nourri depuis ce tems-là, j'ose dire, des milliers de Polypes ; & je n'en ai trouvé aucun qui n'ait multiplié, après avoir pris une certaine quantité d'alimens.

EN examinant les Polypes que je nourrissois en compagnie dans des verres, j'étois toujours attentif à toutes leurs démarches, pour voir s'il ne se passoit rien entr'eux d'analogue à ce qui sert à féconder la plupart des animaux. Mais quelques soins que je me sois donnés pour cela, quelque

grand que soit le nombre des Polypes que j'ai observés, je n'ai jamais pu parvenir à remarquer rien de pareil. Cela me fit penser qu'il en étoit peut-être des Polypes comme des Puce-rons , qui , selon la découverte qui avoit été nouvellement faite , & dont

* *Tome I. j'ai déjà parlé ** , sont tous meres , & multiplient sans accouplement. Mais cet exemple ne suffisoit pas : il falloit des preuves , confirmées par des expériences faites sur les Polypes mêmes.

Je mis donc plusieurs Polypes de la seconde & de la troisième espece en solitude ; & afin d'être bien sûr qu'ils n'avoient pu , depuis leur séparation , avoir aucune communication avec d'autres Polypes , je n'ai pris , pour faire cette expérience, que ceux que j'ai séparés moi-même de leur

mere , ou que ceux qui , s'étant séparés d'eux-mêmes , ont été tirés du verre dans lequel étoit leur mere , d'abord après cette séparation , & avant que quelqu'autre jeune se fût séparé , avec lequel il auroit été possible qu'ils se fussent accouplés. On a vu ci-dessus * toutes les précautions que j'ai prises pour faire vivre ces Polyppes dans une parfaite solitude , pour pouvoir toujours les reconnoître , & pour m'assurer qu'eux & leurs descendants , que j'ai aussi mis en solitude , avoient tous multipliés.

* Tome II.
pag. 45.

EN effet tous ceux qui ont vécu seulement pendant quelques jours , & qui ont mangé , ont produit des petits , & ont continué à en produire de plus en plus , à mesure que je les ai nourris.

Non seulement ces premiers Po-

lypes , que j'ai mis en solitude , ont multiplié, mais aussi plusieurs de leurs descendans , que j'ai aussi mis, de génération en génération jusqu'à la septieme , avec les mêmes précautions , en solitude.

J'ai fait cette expérience sur un nombre considérable de Polypes ; & c'est pour cela qu'on peut avec d'autant plus de confiance en conclurre, qu'il n'est pas nécessaire pour qu'un Polype multiplie , qu'il ait eu , depuis qu'il s'est séparé d'avec sa mere, aucune communication avec un autre Polype. C'est même ce dont j'ai eu lieu d'être persuadé , peu après avoir commencé à nourrir des Polypes solitaires. J'en vis plusieurs dont les petits , encore attachés à leur corps, produisoient eux-mêmes d'autres petits * ; c'est-à-dire, pour m'ex-

* *Tom. II.*
pag. 55.

primer en d'autres termes , qu'ils avoient avant leur séparation le principe de la fécondité.

LORSQUE je fus convaincu qu'un Polype n'avoit pas besoin , pour multiplier, devivre avec d'autres, depuis qu'il s'étoit séparé de sa mere, & que j'eus vu multiplier ces animaux pendant qu'ils étoient encore unis à ceux qui les produisoient, je pensai que c'étoit peut-être pendant cette union que se passoit ce qui devoit contribuer à leur fécondité. Je me mis donc à observer de suite, & avec beaucoup d'attention, de jeunes Polypes qui n'étoient pas encore séparés de leur mere : mais quelques soins que je me fois donnés, je n'ai jamais rien pu remarquer, ni entre les jeunes qui tenoient à une même mere, ni entre ces jeunes & leur mere, qui me don-

nât lieu de former le moindre soupçon. Tous ces Polypes multiplioient sans qu'il m'ait été possible de rien remarquer qui ait pu contribuer à leur génération : ce qui me fit juger que ce que je tâchois de découvrir, supposé qu'il y eût quelque chose de pareil, étoit ou imperceptible, ou au moins très-difficile à voir.

JE fus donc alors réduit à aller encore plus en tâtonnant, que je ne l'avois fait jusques-là.

CE qui sert à féconder les Plantes étant fort secret, & même imperceptible dans la plupart, il me vint dans l'esprit que peut-être les Polypes ressembloient encore aux Plantes à cet égard. Il étoit bien difficile, pour ne pas dire impossible, de pouvoir juger s'il y avoit en effet une pareille ressemblance entre les Polypes & les

Plantes. Aussi ne regardai - je cette idée que comme une conjecture des plus incertaines, & qui ne méritoit pas beaucoup d'attention. Cependant il me parut convenable de ne pas négliger de faire une expérience, à laquelle cette conjecture m'avoit fait penser.

ON découvre dans les fleurs des Plantes un pistile & des étamines : & il s'agissoit de savoir s'il n'y avoit point de parties dans les Polypes ; qui eussent le même usage que celles des fleurs des Plantes.

JE supposai donc que ces parties pouvoient être dans la tête & dans les bras des Polypes , & en général, que peut-être c'étoit-là qu'étoit ce qui contribuoit à la fécondation des Polypes, soit à la manière des Plantes, soit à celle des animaux, soit en-

fin d'une maniere parfaitement inconnue. Je me mis d'abord à chercher si les meres & les jeunes ne se communiquoient point le principe de la fécondité au moyen de leur tête & de leurs bras. Pour cet effet je coupai la tête à huit meres qui avoient des petits , dont les bras ne paroissoient pas encore. Je mis chacune de ces huit meres en solitude dans un verre ; & à mesure que leurs bras repoussent , & que leur tête se forme , je les coupois de nouveau. Elles n'ont eu ni bras , ni tête pendant tout le tems que leurs petits sont restés attachés à leur corps ; & par conséquent il n'a pu y avoir entre ces petits & ces meres , par le moyen de ces parties , aucune communication qui pût contribuer à la fécondation. Les petits étant devenus capables de

prendre des alimens , je leur en donnai : ils crurent , ils se séparèrent ; & d'abord après leur séparation je les mis en solitude dans des verres. Ils n'auroient pas dû multiplier , s'il avoit été nécessaire que leur mere leur communiquât le principe de la fécondité de la maniere dont je l'avois supposé : & ce qui prouve que cette supposition étoit fausse , c'est qu'ils multiplièrent tous abondamment après avoir fait quelques repas.

Mais cette communication supposée pouvoit peut-être avoir lieu entre les jeunes qui fortoient ensemble du même Polype. Il n'y avoit gueres de vraisemblance dans cette idée : cependant je ne voulus pas négliger de faire l'expérience qui pouvoit décider , que ces jeunes Polypes ne se servoient point de leur tête pour se ren-

dre féconds les uns les autres. Je coupai donc celle d'une mere qui n'avoit qu'un jeune , & qui a toujours été seul jusqu'à sa séparation. Cependant ce petit a multiplié abondamment dans le verre où je le mis en solitude , après qu'il se fût séparé de sa mere.

J'AI fait une autre expérience , qui prouve aussi qu'un jeune Polype a en lui le principe de la fécondité , avant qu'il ait pu le recevoir extérieurement de sa mere , ni d'aucun autre Polype. J'ai coupé un jeune qui commençoit seulement à pousser , c'est - à - dire , qui n'étoit encore qu'un très-petit bouton , tel que celui qui est marqué *e* , dans la Fig. 1. de la Pl. VIII. On le voit dans la Figure 9. de la même Planche , comme il étoit d'abord , après qu'il eut

été séparé de sa mere avec des ciseaux ; & il est grossi au microscope dans la Figure 10. Ce bouton ayant été mis à part dans un verre , s'est allongé peu à peu , il lui est venu des bras , & il a ensuite multiplié.

ENFIN , pour achever cette discussion , je dirai que , quelque attention que j'aie donnée pour voir si un jeune Polype ne se féconde point lui-même d'une maniere extérieure , je n'ai pu rien appercevoir qui m'ait fait venir la moindre idée de ce que je cherchois.

Il me paroît convenable de rappeler ici en peu de mots à l'esprit , ce que nous apprennent les différentes expériences que j'ai faites , pour découvrir le principe de la fécondité des Polyppes. On en peut conclure :

1°. Qu'un jeune Polype , depuis

qu'il est séparé de sa mere , n'a pas besoin de la compagnie d'un autre Polype pour multiplier.

2°. Que même avant que de s'en séparer , il a le principe de la fécondité , puisque dès-lors il multiplie.

3°. Que si c'est la mere qui lui communique ce principe pendant qu'il lui est uni , ce n'est point qu'il y ait aucune communication entre la tête & les bras de cette mere , ou bien entre la tête & les bras d'un jeune Polype.

4°. Qu'il n'est pas non plus fécondé de cette maniere par un autre jeune , qui sorte de la même mere en même tems que lui.

5°. Que s'il se féconde lui-même , il est assez vraisemblable que c'est d'une maniere imperceptible.

Tout ce que renferment ces cinq

articles , regarde les Polypes de la seconde & de la troisieme espece. J'ai fait sur les uns & sur les autres , les expériences dont ces articles sont les conséquences. Il ne m'a pas été possible de les faire sur les Polypes verts , parce qu'ils m'ont manqué avant que j'eusse poussé mes recherches jusques-là ; & depuis ce tems-là je n'en ai pas pu trouver.

Si nous n'avons pu découvrir comment les Polypes sont fécondés , nous avons au moins appris qu'il ne le sont point comme la plupart des animaux que nous connoissons ; & que par conséquent ils forment encore une exception à la regle prétendue générale , qu'il *n'y a point de fécondation sans accouplement* ; regle qui a déjà été démentie d'une manière bien remarquable , par la découverte

94 *MEM. POUR L'HISTOIRE*
faite depuis quelques années sur les
Puceron.

PENDANT que j'ai fait toutes les observations que j'ai rapportées ci-dessus , sur la maniere dont les Polypes multiplient par rejettons , je n'ai pas négligé de chercher s'ils n'avoient point d'autres manieres naturelles de multiplier. J'ai , par exemple , eu soin d'être attentif à remarquer s'ils ne se partageoient point d'eux-mêmes , c'est-à-dire , si ces animaux ne se multiplioient point naturellement par boutures , ou si au contraire cette maniere de se multiplier n'avoit lieu que lorsqu'on les coupoit en deux , ou en plusieurs parties. J'ai vu en effet des Polypes se partager d'eux-mêmes. L'endroit où ils se sont partagés , s'est peu à peu rétréci , jusqu'à ce qu'enfin un petit mouve-

DES POLYPES. III. Mém. 95
ment a pu opérer la séparation. Chaque portion est devenue ensuite un Polype complet. Il s'est fait en elles la même reproduction qu'on remarque dans les moitiés d'un de ces animaux qu'on a coupés en deux. J'ai observé de secondes parties de ces Polypes , qui se sont partagés d'eux-mêmes , dans lesquelles la reproduction qui devoit se faire pour qu'elles fussent des Polypes complets , n'a eu lieu , même en Été , qu'au bout de quinze jours ou trois semaines. Quelques Polypes se sont partagés par le milieu du corps , & d'autres plus ou moins près du bout antérieur & du bout postérieur. Il y en a quelques-uns de ceux que j'ai nourris pendant long-tems , qui se sont partagés d'eux-mêmes deux ou trois fois. Le plus court intervalle qu'il y ait eu

d'une fois à l'autre , a été de trois mois. Deux de ces Polypes dont je parle , étoient des portions d'un de ces animaux que j'avois successivement coupé en cinquante parties.

QUOIQUE j'aie depuis près de trois ans observé un nombre très-considérable de Polypes , je n'en ai pas vu plus de douze qui se soient partagés d'eux-mêmes. Si cela n'a pas lieu plus fréquemment dans leur séjour ordinaire , je ne sai si on peut regarder cette maniere de multiplier , comme un moyen naturel que la nature ait donné aux Polypes pour perpétuer leur espece , ou plutôt , si on ne doit pas la regarder comme quelque chose d'extraordinaire. Quoi qu'il en soit , il paroît qu'ils ne se multiplient que très-peu par ce moyen , & qu'il n'est nullement comparable

DÉS POLYPPES. III. Mém. 97
parable à la multiplication des Poly-
pes par rejettons.

J'AI aussi cherché si ces animaux
n'étoient point ovipares. Je n'ai ja-
mais rien vu qu'on puisse prendre
pour des œufs, que ce que je vais
décrire.

J'AI remarqué sur le corps de plu-
sieurs Polypes, des petites excres-
cences sphériques, qui y étoient atta-
chées par un pédicule fort court *. Il * Pl. X.
Fig. 2. c.
y en avoit de blanches & de jaunes. c.

Je n'en ai jamais vu plus de trois à la
fois sur le même Polype. Après être
restées quelque tems attachées aux
Polypes, elles s'en sont séparées, &
sont tombées au fond du verre. J'en
ai observé à diverses reprises, avant
& après leur séparation. Elles sont
toutes à la fin devenues à rien, ex-
cepté une seule, qui, peut-être, est

devenue un Polype. Je dis peut-être , parce que je ne suis pas tout-à-fait sûr du fait. Dans le tems où j'aurois dû observer cette excrescence avec le plus d'affiduité , je fus deux jours sans la considérer. Lorsque je revins l'examiner , je trouvai , à la place où je l'avois laissée , un Polype informe , qui paroissoit réellement venir d'un corps sphérique , qui s'allongeoit du côté par lequel il touchoit le fond du verre. Le côté opposé étoit encore arrondi , & l'on y appercevoit les bouts de trois bras qui commençoient à sortir. Peu à peu ce Polype s'allongea , & prit la forme ordinaire de ces animaux. En un mot , je serois assuré que ce Polype est venu d'un de ces petits corps sphériques qui s'étoit détaché d'un Polype , si je n'avois pas été deux jours sans

l'observer, & s'il n'y avoit pas eu quelques petits Polypes dans le même verre.

LA même chose est à peu près arrivée à M. Allamand, qui a aussi observé plusieurs de ces petits corps. Il lui a paru que l'un d'eux étoit devenu un Polype : mais il n'ose cependant pas l'affurer positivement, parce qu'il n'a pas fait non plus l'expérience avec une exactitude assez grande, pour qu'elle puisse le satisfaire.

IL convient donc de répéter ces observations, pour juger plus précisément de ce que deviennent les petits corps sphériques dont il s'agit. Mais supposé qu'ils deviennent des Polypes, je ne sai si on pourroit les regarder comme des œufs, ou comme des Polypes qui prennent ac-

cidentellement , en poussant , une forme sphérique , & qui périclent ensuite , ou parviennent à l'état de Polype parfait.

M. de Reaumur m'a appris , par une Lettre qu'il m'a fait l'honneur de m'écrire le 17. Décembre 1743. que M. Bernard de Jussieu avoit pendant les vacances , trouvé à quantité de Polypes à bras en forme de cornes ; une petite vessie adhérente à leur corps. Il me semble assez vraisemblable que cette petite vessie est la même chose que j'ai appelée un petit

* Pl. X. corps sphérique *. Il a paru à M. de Fig. 2. 2. Jussieu , qu'elle étoit pleine d'œufs : mais étant obligé de suivre sa route , il n'a pu s'assurer assez de ce que donnent ces œufs. Si en effet c'étoient des œufs des Polypes à bras en forme de cornes , ces animaux seroient

DES POLYPES. III. Mém. 107
ovipares & vivipares. Ce n'est en-
core à la vérité qu'une conjecture ;
mais qui ayant été formée par un
Naturaliste, tel que M. de Jussieu,
est digne de la plus grande atten-
tion.

JE dois encore avertir que je n'ai
trouvé de petits corps sphériques ,
que sur les Polypes de la seconde es-
pece ; & cela seulement en Autom-
ne , & au commencement de l'Hi-
ver.

ON découvre aussi en Automne
& au commencement de l'Hiver ,
sur les Polypes de la seconde & de la
troisième espece , de petites excres-
cences fort différentes de celles dont
il a été question jusqu'à présent. El-
les n'ont pas de figure régulière. Il y
en a qui finissent à peu près en poin-
te , & d'autres , dont le dessus est

* PL. X. applari ou arrondi *. Au lieu de tenir
 Fig. 4. au Polype , comme celles dont j'ai
 parlé ci - dessus , par un pédicule ,
 elles lui sont attachées par l'endroit
 le plus large. Elles forment à peu
 près une pyramide , dont la base est
 immédiatement appliquée contre le
 Polype. Ces excrescences sont quel-
 quefois en si grand nombre sur le
 même Polype , qu'elles se touchent
 presque : c'est ce qu'on remarque
 principalement sur ceux à longs bras.
 Elles n'occupent dans les Polypes de
 cette espece , que la portion la plus
 large de leur corps , celle qui est
 comprise entre la tête & le commen-
 * 4, c. cement de la queue *. Toutes ces ex-
 crescences sont blanches , & se font
 facilement remarquer par leur cou-
 leur , sur-tout lorsqu'elles sont en
 grand nombre. On seroit porté à les

regarder comme une maladie des Polypes , ou au moins comme une suite d'une maladie. Il est certain que ces animaux ne sont pas si actifs , lorsque leur corps est couvert de ces boutons : ils ont peu ou point d'appétit , maigrissent en peu de tems , & perdent leur couleur. Quand les Polypes , qui ont des excrescences , recommencent à manger , on voit ces excrescences devenir peu à peu plus petites , & enfin elles se dissipent entierement ; au lieu que les excrescences sphériques se séparent de ces animaux.

J'AI remarqué que les bras des Polypes de la troisieme espece , qui étoient fort incommodés de ces boutons , faits à peu près en forme de pyramide , étoient fort minces & fort courts *. Je n'ai pu les leur voir allonger.

* Pl. X.
Fig. 4.

G iijj

JE vais à présent parler de quelques autres végétations irrégulières , qu'on remarque encore dans les Polypes , lorsqu'on les observe de suite pendant quelque tems.

LEURS bras sont ordinairement simples : ils n'ont aucune branche. Cependant on en voit assez fréquemment un ou deux dans un Polype , qui sont fourchus , & quelquefois même en plus d'un endroit. La branche qui sort du bras , & qui fait cette fourche , est plus ou moins près de leur origine & de leur extrémité. Je ne décrirai ici en particulier , que le bras d'un Polype de la troisième espèce , qui se trouve représenté dans la Figure 11. de la Planche VIII. parfaitement tel que je l'ai vu. Ce Polype avoit un bras fourchu très-remarquable *. Il se divisoit d'abord en *f. ffff*

deux branches en *c*. L'une de ces branches étoit fourchue en deux endroits , savoir , en *d* & en *e* , & l'autre en un endroit , savoir en *i*.

J'AI vu des Polypes verts , & de ceux de la seconde espece qui avoient un , deux , ou trois bras , ailleurs qu'à leur place naturelle *. Ils sortoient du corps , plus ou moins près du bout antérieur , ou du bout postérieur. Je n'ai jamais vu à un Polype plus de trois bras qui fussent ainsi déplacés , excepté à ceux sur lesquels j'avois fait quelque opération. On en verra un exemple dans le Mémoire suivant. Je ne me suis pas apperçu que les bras qui sont ailleurs qu'autour de la bouche , fussent d'aucun usage aux Polypes. La plupart ont diminué peu à peu , & sont enfin entièrement disparus.

* Pl. X.
Fig. 3. *c*
d.

J'AI encore vu sur des Polypes de la seconde espece , des jeunes qui ont toujours conservé la figure d'un cone , & qui n'avoient qu'un bras , lequel sortoit précisément de la pointe de ce cone *. La maniere dont se for-
 ment ces Polypes , ne m'est pas connue. Je ne les ai remarqués que lorsqu'ils étoient déjà formés. Il m'a paru que quelques-uns , au lieu de se séparer de leur mere , ont peu à peu diminué, en sorte que le petit cone a disparu, & qu'il n'est resté qu'un bras à la place où il étoit. D'autres , au contraire , ont d'abord perdu leurs bras , & se sont ensuite séparés du Polype auquel ils tenoient. Je n'ai jamais vu plus de trois Polypes coniques sur le corps d'un autre *. Ce n'est qu'en
 Automne & en Hiver que j'en ai re-

* Fig. 6.
ccc.* Pl. X.
Fig. 6.

ON trouve quelquefois des Polypes, qui peuvent passer pour avoir deux têtes. J'en ai observé quelques-uns lorsqu'ils se sont formés, c'est-à-dire, lorsqu'ils sortoient du corps de leur mere. Quand les bras ont commencé à pousser, il a paru deux têtes au lieu d'une, au bout antérieur de ces jeunes Polypes. D'abord elles se touchoient, mais ensuite, après que le Polype eut fait quelques progrès, chacune de ces têtes s'est allongée, & s'est trouvée ensuite au bout d'une branche. Ces deux branches se réunissoient au reste du corps, qui étoit commun. J'ai gardé assez long-tems de pareils Polypes à deux têtes, après qu'ils se sont séparés de leur mere. Il étoit naturel de prendre une des deux têtes de ces Polypes, pour un petit qui commençoit.

de pousser, en même tems que les bras de sa mere. Dans cette supposition, ces petits auroient dû se séparer au bout d'un certain tems, plus ou moins long, suivant la saison. C'est ce qui n'est pas arrivé à l'égard de plusieurs : ils sont restés très-long-tems attachés au Polype auquel ils tenoient ; & cela sans que l'endroit par lequel ils étoient attachés, se soit étreûi, & que la communication d'une branche à l'autre ait cessé. J'en ai vu quelques-uns qui se sont pourtant à la fin séparés. On peut donc les regarder ou comme un jeune Polype extraordinaire, qui est resté attaché plus long-tems à sa mere que les autres, ou comme une seconde tête du Polype qui s'est séparée, ainsi qu'il arrive au bout antérieur d'un Polype, de se séparer

510 *MEM. POUR L'HISTOIRE*
quelquefois de soi-même du bout antérieur.

ENTRE plusieurs de ces Polypes qui ont d'abord paru avec deux têtes, j'en ai observé un pendant longtemps, que je crois devoir décrire ici. C'étoit un Polype à longs bras. Je l'ai mis dans un verre plat lorsqu'il s'est séparé de sa mere ; & je l'ai bien nourri. Les deux branches ou bouts antérieurs de ce Polype, se sont fort allongés en peu de tems, & la queue commune est peu à peu diminuée, jusqu'à ce qu'enfin elle a disparu. D'abord les deux bouts antérieurs formoient un angle : mais après que la queue eut disparu, ils se sont mis bout à bout, & ont formé un Polype, qui avoit une tête à chaque ex-

* Pl. X. trémité *. Je lui ai donné à manger,
Fig. 5. 4.
& c. tantôt par une bouche, & tantôt par

DES POLYPTES. III. Mém. 511
l'autre : & par laquelle des deux qu'il
ait pris les alimens , ils sont passés
dans tout le corps. Le milieu de ce
Polype * étoit plus étroit que les *^{ei.}
deux bouts *. Il étoit tel qu'est la *^{aic.e.}
queue d'un Polype à longs bras ordi-
naire. Celui dont il s'agit à présent ,
a multiplié de côté & d'autre de la
portion étroite. J'ai été très-attentif
pour voir s'il marcheroit , & en ce
cas-là comment il marcheroit. Mais
pendant deux*mois qu'il a été dans
cet état singulier , je n'ai jamais pu
remarquer qu'il ait changé une seule
fois de place. Je l'ai toujours trouvé,
toutes les fois que je l'ai observé ,
couché sur le fond du verre , préci-
sément au même endroit où je l'a-
vois laissé. Il étoit la plupart du tems
assez étendu , & les bras serpen-
toient de différentes manieres sur le fond

* Pl. X. du verre *. Il a été deux mois dans
 Fig. 5. l'état singulier que je viens de décrire. Enfin il s'est formé de nouveau au
 * m. milieu * une queue fort courte. La
 communication qui étoit entre les
 deux branches , s'est fermée , & cha-
 cune paroissoit être un Polype par-
 fait. Il est apparent que ces deux Po-
 lypes se feroient séparés: mais ils sont
 morts de maladie, peu de tems après
 le dernier changement dont je viens
 de faire mention.

Si l'on voit de jeunes Polypes qui
 poussent deux têtes , on a aussi quel-
 quefois occasion d'en observer qui
 n'en poussent point. Il ne sort point
 de bras à leur extrémité antérieure ;
 & il ne s'y forme point de bouche.
 On pourroit regarder ces jeunes Po-
 lypes imparfaits comme des queues
 extraordinaires qui viennent à la
 mere

niere Polype ; ils en font en effet les fonctions. Souvent le Polype, dont ils sortent , s'en sert pour se cramponner contre les corps , lorsqu'il marche & lorsqu'il est en repos , de la même manière qu'il se sert de son bout postérieur. J'ai vu le 18. Janvier 1743. jusqu'à sept de ces queues extraordinaires sur un même Polype *, qui a-
 * Fig. 7.
 voit outre cela deux jeunes ordina-
 99999
 99999
 res , & trois de ces Polyppes coniques dont j'ai parlé ci-dessus *. On peut
 * 99999
 juger par la Figure 7. de la Planche X. qui le représente exactement , combien la figure de ce Polype étoit bizarre. Il avoit alors un an & demi. L'Eté suivant il ne restoit sur son corps aucun de ces jeunes extraordinaires. Il avoit repris la forme ordinaire des Polyppes.

IL me faudroit entrer dans un trop

114 MEM. POUR L'HISTOIRE

grand détail, si je voulois décrire toutes les variétés de figures qu'ont produit, dans les Polypes que j'ai nourris pendant long-tems, les végétations irrégulières auxquelles ces animaux sont sujets. Ce que j'en ai dit suffit pour faire comprendre qu'à cet égard les Polypes ont encore plus de rapport avec les Plantes, qu'avec les Animaux qui nous sont connus.

APRES avoir exposé tout ce que j'ai pu découvrir sur la maniere dont les Polypes multiplient, & fait voir qu'elle ressemble beaucoup à ce que nous connoissons dans les Plantes à cet égard, il ne sera peut-être pas inutile d'examiner ici plus en détail en quoi consiste cette ressemblance.

LES Plantes se multiplient de trois manieres différentes. 1°. Par graine. 2°. Par bouture. 3°. Par rejettons. El-

les ne rassemblent pas toutes ces trois propriétés.

Nous n'avons jusqu'à présent rien découvert dans les Polypes, que l'on puisse assurer être de la graine : ainsi à cet égard nous ne pouvons marquer aucun rapport entr'eux & les Plantes. Mais nous en trouvons au contraire un très-grand aux deux autres égards. Ce que j'ai dit au commencement du premier Mémoire * * *Tome I.* sur la reproduction, qui se fait dans *P. 33. &c.* les portions d'un Polype qu'on a coupé en deux, suffit pour nous faire comprendre que ces portions de Polype ressemblent beaucoup aux boutures des Plantes ; & tout ce que j'ai rapporté dans celui-ci sur la manière naturelle dont ces animaux multiplient, nous a fait voir que les jeunes Polypes sont véritablement des re-

jettons qui sortent des vieux, comme les rejettons sortent d'une Plante. Mais à la vérité les rejettons des Polypes se séparent d'eux-mêmes, au lieu que ceux des Plantes doivent être séparés par art. C'est au moins ce qu'on est obligé de pratiquer par rapport à ceux des Plantes, qu'on fait multiplier par rejettons dans les jardins & dans les pepinieres.

Il y a cependant une Plante fort commune, dont les rejettons se séparent d'eux-mêmes. Je veux parler de la Lentille aquatique. Elle est composée d'une seule feuille qui flotte ordinairement sur l'eau, & qui pousse du milieu de sa superficie inférieure un ou plusieurs fils assez déliés, qu'on peut regarder comme des racines. Pour peu qu'on observe de suite cette Plante pendant l'Été, on verra sortir

de ses bords , en différens endroits , d'autres feuilles , qui pousseront des racines, lorsqu'elles seront parvenues à une certaine grandeur. Ces feuilles , ou pour parler autrement , ces rejettons ne tiennent que très peu à la Plante dont ils sortent quand ils sont formés. Alors ils s'en séparent d'eux-mêmes , & abandonnés seuls au mouvement de l'eau , ils peuvent en peu de tems se trouver fort éloignés de la Plante qui les a produits.

IL est donc constant que les Polyppes , de même que plusieurs sortes de Plantes , se multiplient par bouture & par rejettons , & qu'il y a par conséquent à ces deux égards beaucoup de rapport entre leur maniere de se multiplier. Mais n'y auroit-il point aussi de rapport entre la maniere dont les Plantes & celle dont les

Polypes sont fécondés ? Tout ce que nous connoissons par rapport à un grand nombre de Plantes , c'est qu'il y a dans leurs fleurs des parties qui contribuent à leur fécondation , savoir le pistile & les étamines , en sorte que , quand ces parties manquent , les Plantes sont incapables de produire des graines fécondes. C'est ce qui ne peut , jusqu'à présent , nous faire connoître ce qui sert à féconder les Polypes , parce que nous n'avons rien découvert dans ces Animaux qui fût analogue aux fleurs des Plantes , & à la graine qu'elles produisent.

MAIS ce qui se passe dans les fleurs des Plantes influe-t-il sur leur fécondité à l'égard des boutures & des rejettons ? Par exemple , la Vigne peut-elle multiplier par bouture , & l'Orme par rejettons , indépendamment

de ce qui se passe dans leurs fleurs ; ou la Vigne ne peut-elle multiplier par bouture, & l'Orme par rejettons, que lorsque ce qui sert à féconder les graines s'est passé dans les fleurs ? Il fera nécessaire d'entrer dans une petite discussion pour répondre à cette question : & ce que je dirai à cette occasion , pourra peut-être servir à nous faire au moins entrevoir un rapport encore plus grand entre les Polypes & les Plantes qui multiplient par boutures & par rejettons.

IL est fort vraisemblable que ce qui se passe dans les fleurs , ne sert à les féconder que par rapport aux graines, & nullement par rapport aux rejettons & aux boutures. Voici le fait sur lequel je fonde ce que je dis. Il n'y a rien de plus connu que ces fleurs qui sont naturellement simples, mais

qui deviennent quelquefois doubles. On fait que les Plantes , qui ont des fleurs simples , donnent de la graine , mais que celles de la même espece qui ont des fleurs doubles , n'en donnent point ; & on n'ignore pas que ce qui a rendu ces Plantes à fleurs doubles incapables de porter des graines , c'est que les parties qui servent à la fécondation & à la formation de la graine , sont devenues des pétales. Ce qui se passe dans les fleurs , & qui sert à la fécondation des Plantes par rapport aux graines, n'a donc pas lieu dans les Plantes à fleurs doubles dont nous venons de parler. La chose n'a, par exemple, pas lieu dans une Plante de Giroflier double. Cependant indépendamment de cela cette Plante multiplie par rejettons , & les rejettons peuvent en produire d'autres

qui, de générations en générations, feront toujours également propres à multiplier de cette manière. C'est ce que l'expérience nous apprend, & d'où l'on peut conclure qu'un Giroflier double peut multiplier par rejettons, indépendamment de ce qui se passe dans ses fleurs.

ON pourroit même peut-être étendre cette conclusion aux Plantes qui ont des fleurs parfaites, & qui peuvent multiplier par graine. Suivant ce raisonnement on pourroit, par exemple, dire que ce qui se passe dans les fleurs d'un Orme, & d'où résulte la fécondation des graines, n'influe point sur la fécondation de cet arbre par rapport aux rejettons, qu'il en peut produire indépendamment de ce qui se passe dans ses fleurs; & même que les rejettons qu'il produira,

seront non-seulement en état de multiplier par rejettons , mais aussi par graines. Il semble donc qu'à l'égard des rejettons les Plantes sont fécondes par elles-mêmes. Ce que j'ai dit des rejettons , peut aussi se dire des boutures. Il est fort apparent que ce qui fait qu'une bouture peut devenir une Plante parfaite, & multiplier ensuite & par boutures & par rejettons, n'a pas de rapport à ce qui se passe dans les fleurs , & qui influe sur les graines. Le sarment d'une Vigne, par exemple , est également propre à fournir des boutures , soit qu'il ait eu des fleurs , ou qu'il n'en ait point eu.

N'EN seroit-il donc point des Polypes comme des Plantes qui multiplient par rejettons & par boutures ? Ne seroient-ils point féconds par eux-mêmes , propres à produire des rejet-

tons & des boutures, sans qu'il se soit passé en eux rien d'analogue à ce que nous connoissons dans plusieurs Animaux, & à ce qu'on a lieu de soupçonner dans les fleurs des Plantes ?

ON est actuellement en état de juger que la maniere extraordinaire dont les Polypes à bras, en forme de cornes, peuvent se multiplier par la section de leurs parties, n'est pas la seule propriété singuliere qui les distingue de tant d'autres Animaux, & qui ait été si long-tems inconnue dans cette classe de corps organisés. Leur maniere naturelle de se multiplier par rejettons, doit être mise dans le même rang ; & elle n'est pas moins propre à nous apprendre combien les regles prétendues générales, qui ont été admises presque universellement, méritent peu ce nom, quand même

on ne trouveroit d'autres exceptions que celles que forment les Polypes dont je donne l'histoire.

Mr. de Reaumur nous a appris dans la Préface du sixieme Volume de ses Mémoires sur l'Histoire des In-
 * Page
 55. & f. sectes *, que plusieurs Curieux, après avoir été informés qu'on pouvoit multiplier les Polypes en les coupant, ont découvert la même propriété dans différentes especes de Vers ; & cette expérience a encore réussi sur un plus grand nombre d'Animaux , depuis que cette Préface est écrite. Il étoit bien vraisemblable , comme le dit ce célèbre Naturaliste , que les Polypes ne devoient pas être les seuls auxquels il eût été accordé de pouvoir être multipliés d'une façon si étrange. Plus on examine les productions & les opérations de la Nature , & plus on reste

convaincu qu'il ne s'y trouve rien d'unique. C'est, je crois, ce qui peut s'appliquer à l'une & l'autre maniere de multiplier des Polypes : & en conséquence de ce principe, il y avoit lieu de penser, après avoir vu pousser des rejettons aux Polypes, que cette façon de multiplier, quelque étrange qu'elle parût, n'étoit pas particuliere à ces seuls Animaux ; mais qu'elle étoit au contraire commune à plusieurs autres de différentes especes, & même de différens genres.

QUELQUE fondée que fût cette conjecture, on ne pouvoit que désirer de la voir confirmer par des exemples. Je n'eus pas besoin d'attendre long-tems pour en trouver un très-remarquable. La figure des Animaux qui me l'ont fourni, m'a engagé à les ranger dans la classe des

Polypes. Leurs bras sont placés à leur extrémité antérieure, autour de leur bouche. Ils sont rangés fort régulièrement, & forment un joli panache*.

* Pl. X.

Fig. 8.

acdde.

Celui de cette Figure est représenté fort en grand. On les voit de grandeur naturelle dans la Figure 9*. J'ai donné à ces Animaux le nom de Polypes à panache, pour les distinguer des autres Polypes.

* P. P. P.

EN cherchant des Polypes verts au mois d'Avril 1741. je trouvai, comme je l'ai déjà dit, les premiers Polypes de la seconde espèce que j'ai vus. Ce fut en même tems que je découvris les Polypes à panache. Il y en avoit plusieurs sur les Plantes aquatiques, que j'avois rassemblées dans des verres pleins d'eau. Ces Polypes à panache excitèrent extrêmement ma curiosité. Ils reveillerent d'abord

dans mon esprit l'idée d'une fleur épanouie *, & comme il y en avoit plu-
 fleurs ensemble, ils formoient une sorte de bouquet *. Il faut que je dé-
 crive un peu plus en détail la structure de ces Animaux, afin que je puisse me faire mieux entendre lorsque j'en viendrai à leur maniere de multiplier par rejettons.

LEUR corps * a environ une ligne de longueur, sans compter le panache *, qui est presque aussi long que le corps. Celui-ci est fort mince, il est à peu près cylindrique, & sa peau est parfaitement transparente. Le panache n'est qu'une continuation de cette peau transparente; il est fort large à proportion du corps, & d'une figure très-remarquable. Sa base * est faite en forme de fer de cheval, & des bords de cette base sortent les bras

* Pl. X.

Fig. 8.

ibide.

* Fig. 9.

* Fig. 9.

ic. Fig. 8.

ibat.

* Fig. 9. e.

Fig. 8.

acddde.

* Pl. X.

Fig. 8.

e a c.

* ad, ad.

a d.

du Polype : ils sont tous un peu recourbés en-dehors. Le panache qu'ils forment par leur assemblage , a l'air d'une fleur monopétale épanouie. Ces bras sont fort près les uns des autres : j'en ai compté au-delà de soixante à un seul panache. On pourroit les comparer, par rapport à leur épaisseur & à leur transparence , à des fils de verre très-fins. La base du panache est creusée en gouttière, elle tient

* Pl. X. au Polype par le milieu * du fer à
Fig. 3. c. cheval qu'elle forme, & c'est-là qu'est une ouverture qui sert de bouche à

* ch, fg, fd. cet Animal. Ses intestins * se distinguent facilement à travers la peau transparente de son corps. Ils sont d'un brun assez foncé dans les Polypes qui ont bien mangé. Après avoir observé pendant quelque tems les Polypes à panache , & être parvenu

à

à les voir manger , j'ai été en état de distinguer trois parties principales dans leurs intestins ; savoir, l'oesophage *, l'estomac *, & l'intestin droit *. ^{* e hi} ^{* fg} ^{* fa}

Ces Animaux ont , ce me semble, encore plus l'air de Plante , que les Polypes à bras en forme de cornes. Aussi de très-habiles Naturalistes en ont-ils pris diverses especes , qu'ils ont remarquées sur la superficie de différentes prétendues Plantes marines , pour des fleurs & pour des racines. S'ils avoient eu occasion d'observer dans ces Polypes à panache marins une propriété , qu'ils ont apparemment aussi bien que les nôtres d'eau douce, ils auroient reconnu ces Animaux pour ce qu'ils étoient. Ils sont voraces , & même très-voraces, au moins ceux de l'espece que j'ai observée. A la vérité ils ne peuvent man-

ger que des Animaux fort petits : mais en un jour ils en dévorent un grand nombre. Le panache des Polypes est pour ces petits Animaux un goufre dans lequel sont précipités la plupart de ceux qui en approchent en nageant. Si l'on observe attentivement à la loupe des Polypes à panache , placés dans de l'eau bien peuplée de fort petits Insectes , il sera très-facile de remarquer par quel moyen ils attirent leur proie & la font tomber dans leur bouche : on verra d'instant en instant un bras ou deux se recourber subitement en dedans du panache , & puis se remettre dans leur première situation. Il arrive rarement que le même bras se recourbe deux fois de suite. Si en même tems qu'on examine l'action de ces bras, on jette un coup d'œil autour du panache, on

remarque de petits Animaux qui nagent au-dessus, & qui sont successivement précipités dans ce panache, à mesure que les bras se courbent. Ces bras ne touchent point la proie, mais ils occasionnent dans l'eau par leur mouvement une sorte de tournant qui la conduit dans le panache. Elle fait souvent des efforts pour s'échapper : mais l'inflexion subite d'un bras donne au torrent qui l'entraîne un nouveau degré de rapidité, qui la porte malgré elle jusqu'au fond du panache. J'ai dit que ce fond, cette base du panache étoit creusée en gouttière. Les petits Insectes qui doivent servir de proie au Polype, tombent donc dans cette gouttière, & ils coulent ensuite dans la bouche qui est au milieu *. Quand le Polype

* Pl. X:
Fig. 8. 6.

T32 MEM. POUR L'HISTOIRE

facilement lui voir avaler sa proie:
 On la voit passer de l'œsophage dans
 l'estomac, & si elle n'est pas extre-
 mement petite, on la distingue mê-
 me dans cet estomac, parce que tou-
 tes les parties de ces Polypes sont
 transparentes. J'appelle l'œsophage
 ce petit canal * qui va de la bouche
 jusqu'à un sac *, qui sert d'estomac
 au Polype. L'œsophage finit un peu
 au-dessous de l'extrémité supérieure
 de l'estomac, savoir en *b*. Les ali-
 mens rendent cet estomac très-re-
 connoissable. Ils sont ballottés dedans
 d'une maniere très-sensible, & beau-
 coup plus vite que dans les Polypes
 à bras en forme de cornes. Ils sont
 successivement poussés de bas en-
 haut, & de haut en-bas. On peut fa-
 cilement se tromper sur la véritable
 longueur de l'estomac. On pourroit

* e b.

* f g.

croire qu'il va jusqu'à la base du panache. Mais pour prévenir cette erreur, il suffit de bien remarquer jusqu'où sont portés les alimens, lorsqu'ils sont poussés vers le haut de l'estomac. On s'appercevra qu'ils s'arrêtent un peu au-dessus de l'endroit où l'œsophage rencontre l'estomac; & que c'est delà * qu'ils partent pour ^{* Pl. X.} retourner vers l'autre extrémité *. En- ^{Fig. 8. f.} ^{* g.}tre ce bout supérieur de l'estomac & la base du panache, il y a donc un espace occupé par un petit sac *, qui ^{* f. a;} est très-souvent parfaitement rempli par une matiere brune, & plus foncée que celle qui est dans l'estomac. Ce sac est l'intestin droit, & cette matiere brune est celle des excréments. Elle forme un grain un peu oblong, très-facile à remarquer, & qui occupe toute la capacité de l'intestin

droit. Il se vuide entierement en une seule fois. Ce grain de matiere brune qui le remplit , en sort tout entier par une ouverture qui est à la base , ou à côté de la base du panache. J'ai vu souvent des Polypes rendre leurs excréments, mais je n'ai jamais pu découvrir précisément la situation de l'ouverture dont ils sortoient. Après que le Polype a rendu ses excréments, l'intestin droit , qui est alors vuide , paroît d'un brun fort clair , il est même assez transparent. Si cet Animal est dans une eau bien peuplée d'Insectes , & s'il en avale beaucoup , comme cela arrive ordinairement ; de nouveaux excréments passeront bientôt de l'estomac dans l'intestin droit, il se remplira , & reprendra sa premiere couleur & son opacité.

J'ai dit ci-dessus que les Polypes à

panache , pour attirer leur proie dans leur bouche , recourbent en-de-dans quelques-uns de leurs bras. On voit faire quelquefois un autre mouvement à ces bras. C'est lorsqu'il est tombé dans le panache un animal trop grand pour pouvoir être avalé , ou quelque autre corps. Les Polypes , pour s'en débarrasser , ouvrent leur panache en tout, ou en partie ; ils renversent beaucoup leurs bras en dehors , & les remettent ensuite dans leur attitude ordinaire. Ces bras se renversent & se remettent tous ensemble.

LES Polypes à bras en forme de cornes , se contractent lorsqu'on les touche , lorsqu'on remue le corps auquel ils sont attachés : mais ceux à panache sont incapables de contraction. L'atouchement, ou le mouvement qu'on

leur fait éprouver, ne laissent pas cependant de changer beaucoup leur attitude & leur situation : ils disparaissent même alors très-subitement ; ils se retirent entièrement

* Pl. X. dans une cellule *, qui est d'une
Fig. 8.
ibim. matière semblable à celle des parties

que j'ai déjà décrites, & dont le corps de ces animaux est une production. On peut voir très-distinctement, à travers les parois transparentes de cette cellule, le Polype, lorsqu'il s'y est retiré *. Pour com-

* i o g. prendre dans quelle situation est un Polype qui est retiré dans la cellule, on doit savoir que la peau du Polype

* Pl. X. est attachée à l'orifice * de la cellule,
Fig. 8.
* i b, ib. le, en sorte que quand il rentre de-

dans, cette peau ne peut pas le suivre. Elle reste donc attachée par son extrémité inférieure à l'orifice de la

cellule , & elle y rentre en se renver-
 fant. Le panache qui tient par sa
 base à l'extrémité supérieure * de cet- * a.
 te peau , rentre avec elle , & se trou-
 ve logé dans le tuyau qu'elle forme
 lorsqu'elle est toute rentrée & toute
 renversée *. Les intestins sont plus * ab.
 enfoncés dans la cellule qu'aucune
 autre partie *. Comme l'orifice de la * ag.
 cellule & le tuyau que forme la peau ,
 sont beaucoup plus étroits que le
 panache , il est obligé de se fermer
 pour pouvoir y entrer : les bras se
 rapprochent , comme le feroient les
 barbes d'une plume qu'on forceroit
 à entrer dans un tuyau étroit *. Après * ag.
 avoir vu le Polype se cacher dans sa
 cellule , on l'en verra bientôt sortir
 si on le laisse tranquille. On voit pa-
 roître les bras , qui sont d'abord réu-
 nis en faisceau : mais quand ils sont

environ fortis à moitié , ils commencent à s'éloigner par leur extrémité ; enfin le panache s'ouvre , il reparoit comme il étoit auparavant , & le corps se montre en dehors de la cellule.

Si l'on observe avec attention un Polype qui sort de sa cellule, on verra une chose qui prouve clairement que la peau se retourne lorsqu'il y entre , & qu'elle renferme ensuite le panache. Quand le panache commence à paroître hors de la cellule , on remarque la peau qui paroît avec lui , on voit le panache se dégager de cette peau , à mesure qu'elle se remet dans son premier état , & les intestins entrer dans le tuyau qu'elle forme de nouveau en dehors.

J'AI vu distinctement, lorsque les Polypes à panache étoient bien en

dehors de leur cellule, un fil qui tenoit d'un côté à l'extrémité inférieure de l'estomac *, & de l'autre au fond de la cellule; j'en ai vu d'autres qui m'ont paru s'attacher par une extrémité près de la base du panache, & par l'autre aussi au fond de la cellule *. Il est apparent que ces fils servent à retirer le Polype dans la cellule.

ON trouve rarement un Polype à panache seul. Il y en a ordinairement plusieurs ensemble; & ceux de l'espece dont je parle, sont rangés à côté les uns des autres. Souvent il y en a plusieurs qui sortent d'une même cellule *, mais par des orifices différens *. Ce que je vais dire sur la manière dont ces animaux multiplient, servira en même tems à expliquer pourquoi ils se trouvent ainsi

* Pl. X.

Fig. 8. g.

* a. o.

* ik lb.

* i b, i b,

x. y. &

Fig. 9.

les uns à côté des autres.

IL faut avoir une idée bien nette de la figure des Polypes à panache, & être déjà exercé à les observer, pour voir distinctement les jeunes lorsqu'ils commencent à pousser. Il se fait d'abord une petite élévation sur la superficie de la cellule d'un Polype déjà formé, on découvre ensuite le

* Fig. 9. corps & le panache *, ou plutôt

^{Fig. 8.} * Fig. 8. la base du panache * du jeune qui commence à pousser, & la pointe

^{Fig. 9.} des bras * qui sortent des bords de cette base. Ces bras croissent à mesure que le corps croît. Le jeune Polype est d'ordinaire en état de manger au bout de quelques jours. Ses intestins, qui étoient d'abord tout-à-fait transparens, deviennent bruns, après qu'il a pris des alimens.

QUAND la nourriture est abon-

dante dans l'eau où sont les Polypes à panache , les jeunes poussent en grande quantité. J'en ai souvent vu plus de cent qui étoient réunis ensemble , & qui formoient un fort joli bouquet. Ils se séparent ensuite , mais non un à un. Le bouquet se partage en deux ou trois parties , qui ont plus ou moins de Polypes*. Cette séparation se fait fort insensiblement. D'abord la masse que forment toutes les cellules , ou pour mieux dire , la cellule commune , se divise en deux ou trois branches , & puis ces branches se séparent peu à peu entièrement les unes des autres. Pour observer commodément ce que je viens de décrire , j'ai fait en sorte que des bouquets de Polypes à panache se sont attachés contre les parois d'un poudrier. J'ai pu les observer avec

* Pl. X.
Fig. 9.

une forte loupe. Non-seulement j'ai vu par ce moyen multiplier ces animaux, & les différentes branches des bouquets qu'ils forment, se séparer ; mais j'ai encore remarqué que ces branches s'éloignoient ensuite les unes des autres. Leur mouvement progressif est si lent, qu'il est absolument imperceptible. Je n'ai jamais observé de Polypier peuplé de Polypes, qui ait fait plus de demi-pouce de chemin en huit jours de tems. J'en ai aussi observé plusieurs, qui sont pendant très-long-tems restés au même endroit.

J'AI dit ci-dessus que le corps des Polypes étoit une production de la cellule dans laquelle ils se retirent, afin qu'on ne crût pas qu'elles font leur ouvrage, comme les fourreaux de Teignes font l'ouvrage des Tei-

gnes. Les cellules doivent être regardées comme une partie du corps des Polypes : elles croissent avec lui & comme lui , & sont composées de la même matiere , au moins celles des Polypes à panache que j'ai observés.

Ce que je viens de dire sur la maniere dont les jeunes Polypes à panache poussent aux côtés de ceux qui sont déjà formés , suffit pour faire sentir le grand rapport qu'ils ont à cet égard avec les Polypes à bras en forme de cornes ; c'est-à-dire , qu'ils multiplient par rejettons , comme ces derniers. Ils nous fournissent par conséquent un second exemple de cette maniere de multiplier parmi les animaux.

M. de Reaumur en rapporte encore plusieurs exemples dans la Pré-

face du sixieme Tome des Mémoires
 * *Tome I.* pour servir à l'Histoire des Insectes * ;
 pag. 76. savoir, ceux de diverses especes de
 Polypes à panache marins. Il en a
 même découvert de nouvelles , de-
 puis que cette Préface est écrite , &
 il est plus que vraisemblable qu'un
 grand nombre de corps organisés ,
 qu'on a pris si long-tems pour des
 plantes , se trouveront aussi être des
 Polypiers , remplis de Polypes. Ce
 qui rend cette conjecture très-vrai-
 semblable , c'est le rapport qu'ont
 entr'eux tous ces corps qu'on a ran-
 gés dans la classe des plantes marines,
 & dont plusieurs sont certainement
 des amas de Polypes.

JE n'entrerai pas dans un plus
 grand détail sur ce sujet : je ne sau-
 rois mieux faire que de renvoyer à
 ce que dit M. de Reaumur dans la

Préface

Préface que j'ai citée, & à ce que lui & M. Bernard de Jussieu donneront encore au Public sur un sujet si intéressant.

JE crois devoir faire encore mention d'un fait touchant les Polypes d'eau douce à panache. Ils multiplient non-seulement par rejettons, mais ils font aussi des œufs. C'est ce que nous apprend M. de Reaumur dans la Préface dont j'ai fait mention ci-dessus*. Il a observé avec M. Bernard de Jussieu, que les Polypes^{76.} d'eau douce à panache, ont pondu des œufs bruns & un peu aplatis, & ces Messieurs ont vu naître des petits de ces œufs. J'ai vu dans plusieurs des Polypes à panache sur lesquels j'ai fait mes observations, de petits corps sphériques de différentes grandeurs, blancs & transparens. J'ai

* Page

seulement soupçonné que ces petits corps étoient des œufs : mais je n'ai pas eu occasion d'examiner si ce soupçon étoit fondé , ou non. Ces petits corps dont je parle , étoient très-faciles à distinguer à travers la peau transparente du Polype , & celle de la cellule. Ils étoient dans un mouvement continuel , & comme ballottés d'un endroit à l'autre. Je les

* Pl. X. voyois passer de la cellule * dans le
 Fig. 8. i corps d'un Polype * , & monter entre
 k l b m. la peau & les intestins , jusques près
 * a b i e. de la racine du panache * , & de là
 * c. retourner ensuite dans la cellule. Ce n'est pas tout : ceux qui sortoient du corps d'un Polype , & passaient dans la cellule , n'étoient pas toujours poussés de nouveau dans le corps du même Polype , mais successivement dans celui de divers autres. C'est à

quoi j'ai fait une grande attention , parce que ce fait prouve clairement que les cellules de différens Polypes communiquent entr'elles , ou plutôt que plusieurs de ces animaux ont une cellule commune : & si ces corps sphériques , que j'ai vus passer successivement dans le corps de différens Polypes , sont des œufs , on pourroit dire que ces œufs sont en commun à tous les Polypes , dont les corps communiquent ensemble par leur cellule.

ON a vu ci-dessus que les Polypes à bras en forme de cornes , se partagent quelquefois d'eux-mêmes ; c'est-à-dire , qu'ils multiplient quelquefois d'eux-mêmes par boutures : cependant , comme je l'ai déjà dit , il m'a paru que cela étoit arrivé trop rarement , pour qu'on pût dire que

cette maniere de se multiplier soit ordinaire & naturelle aux Polypes ; & sur-tout pour qu'on pût la mettre dans le même rang que leur maniere de multiplier par rejettons. Mais il y a des animaux qu'on multiplie aussi en les coupant comme les Polypes , & qui ont la propriété de se séparer d'eux-mêmes , & de multiplier par boutures très-fréquemment. Je connois une espece de vers , que j'ai déjà observés avec attention , qui multiplient beaucoup , & que je n'ai vus encore multiplier que par boutures. Il s'agit des Mille-piés à dard , dont

* Pl. VI. j'ai parlé dans le second Mémoire *.

Fig. 1.

Tome I.

pag. 167.

& suiv.

M. de Reaumur a coupé de ces Mille-piés , & il nous apprend dans la Préface du sixieme Tome des Mémoires sur les Insectes * , le succès de son expérience. Il a vu chaque portion

DES POLYPTES. III. Mém. 149
 de Mille-piés devenir un Mille-piés
 complet. C'est en faisant la même ex-
 périence sur ces animaux , que j'ai
 appris que la multiplication par bou-
 ture avoit non-seulement lieu en eux
 lorsqu'on les coupoit , mais aussi na-
 turellement. Ce fut dans le mois de
 Mai 1741. que j'essayai pour la pre-
 miere fois de couper un Mille-piés à
 dard en deux parties , pour voir s'il
 avoit la même propriété que les Po-
 lypes que j'observois. Je mis les deux
 moitiés dans un verre plat. Elles
 étoient faciles à distinguer l'une de
 l'autre. La premiere avoit à son ex-
 trémité antérieure une tête , très-
 remarquable par le dard charnu qui
 la termine * , & par un point noir * Pl. VI.
 qu'elle a de chaque côté. Ces deux Fig. 1. d_a
 points noirs sons peut-être les yeux
 du Mille-piés. Environ demi-heure

après avoir séparé les deux moitiés dont il s'agit ici , je vins les considérer avec une loupe ; & quelle ne fut pas ma surprise lorsque je m'aperçus que chacune avoit une tête parfaitement formée ! Il n'y avoit nulle apparence qu'il fût venu en aussi peu de tems , une tête à la seconde partie du Mille-piés ; & en effet je ne pouvois me persuader que ce fût-là l'explication de l'énigme qui-m'embarrassoit. Je me mis d'abord à couper un autre Mille-piés en deux , afin de tâcher de juger du fait singulier que je venois de voir. Il arriva encore à l'égard de celui-là , ce qui étoit arrivé à l'égard du premier. Je trouvai , peu après la section , que les deux portions de cet insecte avoient chacune une tête , & étoient des Mille-piés complets. Mais je trouvai dans le

même verre plat où j'avois mis les portions du second Mille-piés que j'avois coupé, outre les deux qui avoient une tête, une troisième portion fort courte & sans tête. Ce fut encore une énigme pour moi, de savoir d'où venoit cette troisième portion ; car j'étois bien sûr que j'avois seulement coupé le Mille-piés en deux. Je pensai à observer des Mille-piés entiers avec plus d'attention que je n'avois fait jusqu'alors ; & c'est par ce moyen que j'ai trouvé ce que je cherchois. Je vis plusieurs de ces animaux qui paroissoient être non un seul Mille-piés, mais deux mis bout à bout. La tête de l'un étoit un peu insérée dans le dernier anneau de l'autre, & son dard étoit dirigé perpendiculairement en-dessus. Je jugeai donc que les Mille-piés que j'avois

coupés, étoient semblables à ceux-là, & que l'opération que je leur avois faite, avoit obligé ces deux Mille-piés réunis à se séparer. Il me parut vraisemblable que cette portion, fort courté & sans tête, que j'avois trouvée dans le verre où étoient les portions du second Mille-piés qui avoit été coupé en deux, n'étoit autre chose que la partie postérieure du Mille-piés antérieur. J'avois apparemment coupé ce Mille-piés à peu de distance de son extrémité postérieure, de l'endroit où la tête du Mille-piés postérieur étoit insérée; c'est-à-dire, qu'un bout du Mille-piés antérieur étoit resté uni au Mille-piés postérieur. Il s'en étoit peu après séparé, & avoit formé cette troisième portion que j'avois trouvée dans le verre,

APRES avoir découvert ce que je viens de rapporter , je fus très-curieux de savoir , pourquoi plusieurs Mille-piés se trouvoient deux à deux , & mis bout à bout l'un de l'autre. J'en considérai plusieurs de suite , qui étoient dans cet état ; & la variété que je remarquai entr'eux , me donna déjà lieu de soupçonner que ces Mille-piés réunis n'avoient jamais été séparés auparavant. Voici enfin ce que j'ai appris , après avoir observé ces animaux pendant quelque tems.

UN Mille-piés qui n'est pas double , le peut devenir en peu de jours. Il se forme une tête , environ aux deux tiers de son corps , à compter du bout antérieur. On voit distinctement le dard charnu de cette tête ; qui croît perpendiculairement en

dessus du corps du Mille-piés ; les points noirs paroissent aux deux côtés de la tête ; enfin le nouveau Mille-piés , qui n'est autre chose que la portion postérieure de celui dont il est venu ; ce nouveau Mille-piés est en état de se séparer , & se sépare de lui-même. Je ne me suis pas contenté d'observer de suite la formation de quelques-uns de ces animaux ; j'ai répété très-souvent cette observation , & j'ai toujours vu la même chose. J'ai nourri en solitude de jeunes Mille-piés que j'ai tirés du verre dans lequel étoit leur mere , au moment même de leur séparation ; je les ai vu croître , j'ai vu leur bout postérieur devenir un Mille-piés , & se séparer. J'ai vu le même Mille-piés produire successivement en quelques semaines plusieurs petits , plu-

fieurs boutures ; & des verres dans lesquels je n'en avois d'abord que quelques-uns , en ont été fort peuplés au bout de quelque tems.

ON peut juger , par ce que je viens de dire de ces animaux , qu'ils méritent fort d'être observés avec attention : c'est aussi ce que je me propose de faire. Ce que nous en savons à présent , suffit pour nous prouver qu'ils fournissent véritablement un exemple d'animaux qui multiplient naturellement par boutures. M. Lyonnet , qui est le premier qui ait coupé des vers , & qui ait vu chaque partie devenir un ver parfait , a aussi remarqué que ces vers qu'il a coupés , se partagent d'eux-mêmes ; & c'est ce que je crois pouvoir aussi dire de ceux avec lesquels j'ai nourri pendant long-tems les Polypes. Mais comme

je ne me suis pas fait une affaire de les observer avec attention , je n'entreprendrai pas de décrire la maniere dont se fait dans ces animaux la multiplication par boutures.

EXPLICATION DES FIGURES

DU TROISIEME MEMOIRE.

P L A N C H E VIII.

LA Figure 1. représente un Polype de la seconde espece dont il sort deux jeunes Polypes : l'un *e*, n'est encore qu'un simple bouton de figure conique ; & l'autre *ic*, est à peu près cylindrique , & les bras paroissent déjà à son bout antérieur *c*.

LA Figure 2. est celle d'un Polype de la seconde espece , qui produit un jeune *ab*, prêt à se séparer.

LES Figures 3. & 4. servent à faire voir la manière dont les jeunes Polyptes se séparent de leur mere. *ab* Fig. 3. est une mere fixée par ses deux extrémités, *a* & *b*, contre un corps quelconque. Le corps de cette mere est disposé à peu près en arc *adb*. Le jeune *cd*, qui tient à sa mere en *d*, est fixé par son bout antérieur *c*. Dans cette circonstance la mere peut contracter son corps, & faire en sorte qu'il devienne la corde *ab* Figure 4. de l'arc de cercle qu'il formoit auparavant *adb* Fig. 3. Le jeune restant attaché en *c* Fig. 4. ne suit pas la mere, & est obligé de s'en séparer : ils se trouvent d'abord à quelque distance l'un de l'autre.

La Figure 5. représente le côté intérieur d'un morceau de peau de Polypte, dont sort un jeune. *t*, ouver-

ture de communication qu'il y a entre la mere & son petit. *o*, ouverture qui est à l'extrémité de la portion restante du jeune, dont le bout antérieur a été retranché.

LA Figure 6. représente la même portion de Polype que la Figure 5. mais vue par dessus. *e*, portion du jeune. *i*, ouverture de communication qui est entre la mere & le petit.

ON voit dans la Figure 7. un Polype *ab* de la seconde espece, tel qu'il est quelque tems après avoir mangé un ver. Une partie du suc a passé dans les jeunes *d, c, e, i, o*, & les a obligés à se renfler un peu.

LA Figure 8. représente un Polype *acb* de la troisieme espece, né depuis quinze jours, & qui porte déjà dix-neuf petits, y compris ceux qui sortent des jeunes, que produit cette mere.

LA Figure 9. est celle du bouton *e* de la Figure 1. séparé du Polype.

FIGURE 10. Ce même bouton , vu au microscope.

LA Figure 11. représente un Polype *ab* de la troisième espèce , remarquable par un de ses bras *afffff* , qui est fourchu en plusieurs endroits ; savoir en *c* , *d* , *e* & *i*.

P L A N C H E I X.

LA Figure qui remplit toute cette Planche , représente une partie d'un morceau de bois , que j'ai trouvé entre plusieurs autres dans le mois de Juillet 1742. dans un fossé de Sorgvliet. Ce morceau de bois est couvert de Polyptes à longs bras.



LA Figure 4. représente un Polype de la troisième espèce, dont la partie *ac*, est couverte d'excroissances à peu près pyramidales & blanches, qui sont sorties du corps de ce Polype.

LA Figure 5. représente un Polype *ac*, à deux têtes, ou, si l'on veut, deux Polypes *am*, *cm*, placés bout à bout l'un de l'autre & réunis. Ce Polype est venu d'un jeune, qui a poussé en même tems deux têtes, à son bout antérieur.

LA Figure 6. est celle d'un Polype de la seconde espèce, auquel sont attachés trois jeunes Polypes coniques *c*, *c*, *c*, & qui n'ont chacun qu'un seul bras à l'extrémité du cône.

J'AI nourri plus de deux ans le Polype représenté dans la Figure 7. Il avoit, environ un an après sa nais-

fance , sept queues extraordinaires *q, q, q, q, q, q, q*, & trois Polypes coniques *c, c, c*.

LES Fig. 8. & 9. représentent des Polypes à panache d'eau douce. Il y en a trois grossis au microscope dans la Figure 8. savoir, *b f a c d d d e h g i* ; qui est en-dehors de la cellule *i k g m b* ; *i b a g*, qui est en dedans de la cellule *i m g l b* ; & le jeune *t x y s*, qui est en-dehors. *a b i e*, le corps du Polype , à travers la peau transparente duquel on distingue l'œsophage *e h*, l'estomac *f g*, & l'intestin droit *a f*. La peau du Polype est attachée à l'orifice *i b*. *a c d d d e*, représente le panache, ou la tête du Polype , composée de la base du panache *e a c* qu'on ne voit que peu , & des bras *a d, a d, a d*, qui sortent des bords de cette base. *i b a g* fait voir un Po-

lype qui est retiré dans la cellule. $i a b$, la peau du Polype renversée en-dedans, & dans laquelle le panache est logé. $a g$, les intestins. $r s$, la base du panache d'un jeune Polype. u, u, u , les bras qui commencent à pousser. $g o, f o$, fils attachés par un bout aux intestins, & par l'autre au fond de la cellule. Ils sont représentés détachés, ou coupés, dans cette Figure; c'est pourquoi ils ne sont pas tendus en $o, o. i b, i b, x y$, les trois orifices des cellules, qui servent chacun à un Polype.

LA Figure 9. représente un bouquet de Polypes à panache, de grandeur naturelle, attaché à un morceau de bois $a b$, par la base $c d$ du Polypier. Cette base $c d$ n'est qu'un amas de la matiere qui a servi de cellule aux Polypes, mais qui n'a plus

cet usage, depuis que le Polypier s'est augmenté & allongé. On trouve souvent des Polypiers qui n'ont point de pareille base. *p, p, p*, panaches de grandeur naturelle. *ic*, corps d'un Polype de grandeur naturelle. *rr*, jeune Polype de grandeur naturelle. On voit outre cela dans cette Figure, que le Polypier qu'elle représente a commencé à se partager en trois branches, dont l'une est prête à se séparer entièrement des deux autres.

Fin du troisieme Mémoire.



Fig. 1.





Fig. 5.



Pl. 9. Mem. 3.



Google

Fig. 2.



Fig. 5.



Fig. 4.






Fig. 7.



Fig. 8.





Fig. 6.



Fig. 9.





M É M O I R E S

POUR L'HISTOIRE

D E S

P O L Y P E S.



QUATRIEME MEMOIRE.

*Opérations faites sur les Polypes , & le
succès qu'elles ont eu.*

 A premiere opération , que
j'ai faite sur les Polypes , a
été de les couper *transver-*
salemment. On a vu en général au com-
mencement du premier Mémoire * , * *Tome I.*
quel en a été le succès. J'ai renvoyé à *p. 26. &c.*
celui-ci le détail de cette expérience.

POUR couper transversalement un Polype, je le place avec un peu d'eau dans le creux de ma main gauche. Il se trouve d'abord contracté au fond de cette eau. On peut, lors même qu'il est dans cet état, le couper avec assez de facilité, pourvu que l'on se serve de ciseaux fort fins. Mais comme il est plus aisé de le diviser précisément où l'on veut, lorsqu'il est étendu, je tiens ordinairement la main, dans laquelle il est, en repos pendant un moment, pour lui laisser le tems de s'étendre; & quand il est tel que je le souhaite, je passe délicatement, sous l'endroit de son corps où il doit être séparé, un des côtés des ciseaux que j'ai dans la main droite; je les ferme ensuite; & d'abord après avoir partagé le Polype, j'examine ses deux moitiés à la loupe, pour juger du

succès de l'opération. Si elle a bien réussi , je mets les deux moitiés de Polype , chacune à part dans un verre , ou toutes deux ensemble dans le même. Quoiqu'on les mette ensemble dans le même verre , il n'est pas à craindre qu'on les confonde , jusqu'à ce que la reproduction , qui doit se faire dans la seconde partie , soit prête d'être achevée.

J'AI mis les portions des Polypes, sur lesquelles j'ai fait mes expériences , dans des verres peu profonds , qui ne contenoient que quatre à cinq lignes d'eau. Par ce moyen j'ai pu toujours observer ces portions avec une loupe , en quelque endroit du verre qu'elles fussent.

COMME j'ai eu en même tems plusieurs verres dans lesquels je tenois des Polypes coupés , j'ai distingué

ferre gueres d'un de ces insectes complets, même peu de tems après que la section a été faite; son bout postérieur* est seulement un peu plus large que celui d'un Polype ordinaire, & il a une ouverture très-sensible. A mesure que cette premiere partie s'étend, l'ouverture qui est à son extrémité postérieure, se ferme; le bout postérieur s'étrécit, & devient tel que celui d'un Polype parfait. Il arrive souvent en Eté, que la premiere partie marche & mange, le jour même qu'elle a été séparée de l'autre. J'en ai même vu qui ont mangé immédiatement après la section.

LA seconde partie*, après s'être* *Fig. 2.* un peu étendue, est pour l'ordinaire ouverte à son bout antérieur*, les bords de l'ouverture sont un peu renversés en dehors. Ils se replient en-

suite en dedans ; & le replis qu'ils forment , sert à boucher l'ouverture dont je viens de parler. Le bout antérieur paroît alors simplement ren-

* Pl. XI.

Fig. 3. c.

flé * ; & il l'est ordinairement plus ou moins , jusqu'à ce que la reproduction qui doit s'y faire , soit achevée. Je n'ai jamais vu de seconde partie qui ait changé de place avant la fin de cette reproduction. La plupart de celles que j'ai observées , sont restées couchées sur le fond du verre au même endroit , plus ou moins contractées ou étendues , & leur bout postérieur attaché contre le verre. Quelques-unes se sont dressées perpendiculairement sur le fond du verre. Les bras qui poussent à l'extrémité antérieure d'une seconde partie , croissent précisément comme ceux des jeunes Polypes. On voit d'abord les pointes

de trois ou quatre , qui sortent des bords de cette extrémité * ; & pen-^{*Fig. 4. 4.} dant que ces premiers croissent , il en paroît d'autres dans les intervalles qu'ils laissent entr'eux. Avant même que ces bras aient fini leur accroissement , ils peuvent arrêter une proie ; & la bouche se trouvant dès-lors parfaitement formée , cette proie est avalée , comme elle pourroit l'être par un Polype complet.

LA reproduction dont je viens de parler , se fait plus ou moins vite , suivant qu'il fait plus ou moins chaud. J'ai vu dans le fort de l'Été , des secondes parties dont les bras ont commencé à pousser au bout de vingt-quatre heures ; & qui , en deux jours , ont été en état de manger ; & dans un tems froid , j'en ai vu dont la tête n'a été formée qu'en quinze ou vingt jours.

IL m'a paru que toutes choses égales, la reproduction se faisoit plus vite dans la seconde partie d'un Polype bien nourri que dans celle d'un Polype qui a jeuné depuis quelque tems.

DE's qu'une seconde moitié a acquis une tête, c'est-à-dire, dès que la bouche est formée, & que les bras sont venus, elle ressemble parfaitement, de même que la première, à un Polype qui n'a jamais été divisé; & elles peuvent l'une & l'autre être regardées comme des Polypes parfaits: elles ont toutes les propriétés connues dans ces animaux; elles font tous les mouvemens dont ils sont susceptibles; elles arrêtent des proies; elles s'en nourrissent; elles croissent & multiplient.

Si l'on coupe transversalement

des Polyppes qui pouffent des petits , ces petits continuent à croître après la section , dans quelque partie qu'ils se trouvent.

IL arrive souvent que des secondes parties qui n'ont point de petits lors de la section , en pouffent avant que d'avoir pu manger , avant que d'avoir des bras. Il m'a paru que la pousse de ces jeunes retarde quelquefois celle des bras. J'ai vu sortir un jeune Polype si près du bout antérieur d'une seconde partie , qu'après avoir un peu crû , il s'est confondu avec ce bout auquel il n'étoit point encore venu de tête : ce jeune paroïssoit être le bout antérieur de cette seconde partie ; mais il étoit un peu incliné , & faisoit avec elle un angle fort obtus au lieu de former une ligne droite. Quand il a pu manger , je

lui ai donné des Vers qui ont passé de son estomac dans la portion de Polype dont il sortoit , comme ils passent de la bouche d'un Polype entier dans son estomac. Quelque tems après , l'extrémité postérieure du jeune Polype s'est rétrécie, ensuite il s'est séparé. La seconde partie est restée encore quelques jours sans bras , qui enfin ont commencé à paroître à son bout antérieur ; il en est venu six.

Non content de savoir que les portions des Polypes divisées en deux , marchaient , mangeoient & multiplioient , j'ai voulu encore m'assurer si elles avoient pour la lumiere le même penchant qui se fait remarquer dans les Polypes qui n'ont pas été

* Tome I. pag. 21. & 137. partagés*. J'ai donc coupé en deux un nombre considérable de Polypes , j'ai mis les premieres parties dans un

verre , & les secondes dans un autre ;
 & j'ai vu , par des Expériences très-souvent réitérées , que les unes & les autres cherchoient l'endroit du verre le plus éclairé.

EN quelqu'endroit que l'on coupe un Polype au milieu de son corps , ou plus ou moins près du bout antérieur ou du bout postérieur , l'Expérience réussit également ; les portions deviennent également des Polypes complets : cela est même vrai par rapport aux Polypes à longs bras , quand on les coupe au - dessous de l'endroit où leur corps commence à se rétrécir , c'est-à-dire , que lorsqu'on sépare une partie de cette queue du reste du corps , cette partie même devient un Polype parfait. A la vérité il faut du tems pour cela ; & il arrive quelquefois que la portion

de Polype meurt par accident avant que la production ait pu avoir lieu.

J'AI souvent coupé simplement les bords du bout antérieur d'un Polype , c'est-à-dire , ce cercle dont sortent les bras * ; & quelque mince qu'il fût , il s'en est formé un Polype qui , au commencement , étoit tout bras , mais dont le corps est ensuite devenu aussi grand que celui des autres , lorsque j'ai eu soin de lui donner à manger. Il arrive quelquefois que de pareils Polypes prennent d'abord une forme assez irrégulière , & que quelques-uns de leurs bras se trouvent placés ailleurs qu'à leur bout antérieur , comme je l'ai déjà dit dans le Mémoire précédent.

IL y a plus : des parties même de cercles pareils à celui dont je viens de parler , des morceaux qui n'a-
voient

* Pl. XI.
Fig. 5.

voient que deux * ou trois bras, sont * pl. XI.
devenus des Polypes parfaits. Il est Fig. 6.
revenu des bras pour suppléer à ceux
qui manquoient.

J'AI séparé des bras, & je les ai
observés pour voir s'ils ne deven-
droient point des Polypes. L'Expé-
rience n'a pas réussi : je ne voudrois
cependant pas décider que le succès
en fût impossible.

CE que je viens de dire servira dé-
jà à faire comprendre qu'on peut avec
succès diviser un Polype en plus de
deux parties ; j'en ai dans le même
moment coupé transversalement en
trois & en quatre, & toutes ces par-
ties sont devenues des Polypes com-
plets.

LA première & la dernière partie
des Polypes partagés en trois ou en
quatre transversalement, sont tout-

à-fait semblables à la premiere & à la seconde d'un Polype qui a été coupé en deux. Le bout postérieur de la premiere doit se disposer en forme de queue , & il doit venir une tête au bout antérieur de la derniere : mais la reproduction qui doit se faire dans les parties intermédiaires , c'est-à-dire , dans la seconde d'un Polype coupé en trois , & dans la seconde & dans la troisieme d'un qui a été coupé en quatre : la reproduction , dis-je , qui doit se faire dans ces portions de Polypes est double ; ce sont des tronçons qui n'ont ni queue ni tête , & ils doivent acquérir l'une & l'autre : c'est en effet ce qui arrive , & en plus ou moins de tems , suivant les circonstances. Pour donner des idées plus précises de ces Expériences , je rapporterai l'extrait de quelques Arti-

DES POLYPES IV. Mém. 173

cles de mon Journal dans lesquels il s'agit de Polypes partagés en trois & en quatre.

J'AI divisé un Polype en trois transversalement , le 18. Juillet 1741.

LA premiere partie a bien réussi ; elle avoit six bras , c'étoient les bras mêmes qu'avoit le Polype qui a été coupé.

LA seconde partie a commencé à pousser un petit le 23. elle n'avoit point encore de bras : j'en ai aperçu le 25. au petit , & à cette seconde partie. Le jeune Polype s'est séparé le 28. La seconde partie avoit alors sept bras.

LES bras ont commencé à pousser le 24. à la troisieme partie : j'en ai remarqué cinq le 25. & sept le 28.

CES trois portions du même Polype ont mangé des Pucerons le 29.

Mij

174 MEM. POUR L'HISTOIRE

Juillet : elles étoient des Polypes complets.

J'AI divisé un autre Polype en trois transversalement, le 15. Juillet 1741.

LA premiere partie avoit sept bras.

LES bras ont commencé à pousser à la seconde le 25. elle en avoit huit le 28.

ILS ont commencé à pousser à la troisieme le 22. j'en ai apperçu sept le 25. & huit le 28.

CES trois portions du même Polype ont mangé des Pucerons le 29. Juillet.

J'AI aussi divisé un Polype transversalement en quatre, le 18. Juillet 1741.

LA premiere partie a bien réussi : elle avoit sept bras.

CEUX de la seconde ont commen-

DES POLYPES. IV. Mém. 175
cè à pousser le 25. j'en ai apperçu
cinq ce jour-là, six le 28. & sept le
29.

LES bras ont commencé à paroître à la troisieme partie le 25. j'en ai remarqué cinq ce jour-là, six le 28. & huit le 29.

LES bras de la quatrieme ont commencé à pousser le 23. deux jours plutôt que ceux des deux précédentes. J'en ai vu trois le 25. qui étoient assez longs : elle en avoit six le 29.

LES Polypes ne sont pas assez grands pour pouvoir être coupés en même-tems, en un fort grand nombre de parties : J'ai suppléé à cela en partageant successivement un Polype en plusieurs portions. Après en avoir coupé un en quatre, j'ai eu soin de bien nourrir chacune de ces quatre parties ; & quand elles ont été

parvenues à une certaine grandeur , je les ai encore coupées en deux ou trois , suivant que leur taille l'a permis : ensuite j'ai aussi fait croître toutes ces portions , & je les ai divisées. De cette maniere j'ai coupé le Polype dont il s'agit en cinquante parties ; je m'en suis tenu là , parce que j'ai cru qu'il suffisoit d'avoir poussé la division jusqu'à ce point. Toutes ces cinquante parties sont devenues des Polypes parfaits : je leur en ai vu faire toutes les fonctions ; j'en ai conservé plusieurs pendant plus de deux années : elles ont beaucoup multiplié. C'est sur un Polype de la seconde espece que j'ai fait cette Expérience.

J'AI nourri de suite pendant plus de deux années des Polypes qui n'ont jamais été coupés , & des Polypes qui sont venus des portions de ceux

que j'ai divisés : je n'ai pas trouvé, toutes circonstances d'ailleurs égales, que les uns multipliasent plus que les autres.

J'AI essayé plusieurs fois de couper transversalement de jeunes Polypes, lorsqu'ils étoient encore attachés à leur mere; & cette Expérience a très-bien réussi. Je ne ferai mention que de quelques cas particuliers.

J'AI coupé transversalement trois jeunes qui sortoient d'un Polype de la seconde espece; j'ai en même-tems coupé la tête à la mere. En quelques jours, je ne saurois dire précisément combien, il est venu une nouvelle tête à la mere & aux secondes parties des trois jeunes qui étoient encore attachés à son corps. Ces jeunes Polypes se sont ensuite séparés de la mere, & ont formé des Polypes

parfaits. Les quatre têtes coupées, c'est-à-dire, la premiere partie de la mere & celles de ses trois petits qui ont été séparées du reste de leur corps, sont aussi devenues des animaux parfaits.

LE 26. Mai 1741. j'ai coupé la tête d'un Polype de la seconde espece, & celles des deux petits qui sortoient de son corps. Les bras ont commencé à paroître le 30. à la seconde partie de la mere & à celle des deux petits qui étoient encore attachés à son corps. Les trois têtes coupées sont aussi devenues des Polypes complets.

J'AI coupé le 23. Juin 1741. la tête d'un Polype à longs bras & celles de deux petits qu'il produisoit. Les bras ont commencé à pousser le 25. à la seconde partie de la mere & à celle de ces petits qui étoient en-

core attachés à son corps. Les petits se sont séparés la nuit du 26. au 27. & étoient déjà alors des animaux parfaits. Les têtes qui ont été coupées à la mere & aux petits, sont aussi devenues des Polypes complets.

APRÈS avoir coupé transversalement un grand nombre de Polypes, j'ai entrepris d'en couper *longitudinalement*, c'est-à-dire, de faire la coupe parallèle à la longueur de leur corps: c'est ce qui est un peu plus difficile que de les couper transversalement; mais on peut cependant en venir facilement à bout en prenant quelques précautions.

ON a beaucoup moins de prise sur un Polype que l'on coupe longitudinalement que sur un que l'on coupe transversalement lorsqu'il est étendu. Pour se procurer de la prise sur celui

qu'on doit couper suivant sa longueur , il s'agit de le faire élargir ; il faut pour cela le faire contracter le plus qu'il est possible , parce que plus le corps d'un Polype est contracté , plus il est large. Je mets le Polype que je veux couper longitudinalement avec un peu d'eau dans le creux de ma main gauche : mais au lieu de le laisser dans cette eau , & de l'y faire simplement contracter , je le conduis avec la pointe d'un pinceau sur le bord de l'eau : il repose alors sur ma main , & je tâche de l'y faire contracter le plus qu'il est possible. Il est à remarquer qu'un Polype s'élargit davantage en se contractant hors de l'eau que dans l'eau ; il s'applatit en partie hors de l'eau sur le corps sur lequel il repose. Ce n'est pas la seule raison pour la-

quelle il vaut mieux que le Polype qu'on doit couper longitudinalement , soit hors de l'eau , plutôt que dedans. Lorsqu'il est dans l'eau , le moindre mouvement que l'on fait , ou en remuant la main dans laquelle il est , ou en passant les ciseaux sous son corps pour le couper , le fait changer de situation , ce qui est souvent cause qu'on ne donne pas le coup de ciseaux où l'on veut. Au contraire , quand un Polype est hors de l'eau , on peut passer facilement les ciseaux sous son corps sans le faire remuer. Il y a encore un expédient , qu'on peut joindre à ceux que je viens d'indiquer, pour rendre plus larges les Polypes qu'on veut couper suivant leur longueur : c'est de leur donner bien à manger avant que de faire cette opération. Les alimens ,

comme on l'a vu dans le second Mémoire, obligent le corps d'un Polype à s'élargir extrêmement. On peut le mettre sur la main lorsqu'il a l'estomac plein, & le couper avec les alimens qu'il a dans le corps. Ce n'est pas le tout que de faire en sorte que le Polype soit bien contracté & élargi sur la main, il faut encore avoir grand soin de le placer de manière qu'il soit disposé en droite ligne, & que ses deux extrémités se puissent facilement distinguer.

Tout cela étant fait, je prends dans la main droite des ciseaux fort fins; j'en fais passer sous le Polype un côté, en commençant par la pointe; & je fais en sorte que ce côté des ciseaux soit disposé sous le Polype parallèlement à la longueur de son corps. On peut commencer à faire

passer le côté des ciseaux sous le corps du Polype, par laquelle des deux extrémités de ce corps qu'on veut : mais comme l'antérieure est ordinairement plus large, il est plus commode de commencer par celle-ci, d'autant plus qu'on peut alors avec plus de facilité partager la tête également. Quand le côté des ciseaux que j'ai fait passer sous le Polype, est disposé parallèlement à sa longueur, & que je vois que sa pointe va tant soit peu au-delà du bout du Polype, opposé à celui par lequel ce côté a commencé à passer sous son corps, je ferme les ciseaux, & le Polype se trouve ordinairement coupé assez également en deux suivant sa longueur.

UN Polype entier forme, ainsi que cela a été dit dans le premier Mé-

* *Tome I. moire* *, une sorte de tuyau qui va
 pag. 104.

d'un bout de son corps à l'autre. Une
 moitié d'un Polype , coupé en deux

* Pl. XI. suivant sa longueur *, forme donc

Fig. 7. un demi-tuyau , dont l'extrémité an-

* 4. e. térieure * est terminée par la moitié

de la tête , c'est-à-dire , par la moitié
 de la bouche , & par la moitié des
 bras , ou à peu près.

APRES avoir coupé le Polype , je
 penche tant soit peu la main , pour
 faire enforte que l'eau qui est dans le
 creux le vienne mouiller ; & puis
 avec la pointe humectée d'un pin-
 ceau , j'écarte les portions de Polype
 l'une de l'autre , & je les étends sur
 ma main humectée , afin de pouvoir
 les examiner à la loupe commodé-
 ment. Chacune paroît alors être une
 petite bande de peau de Polype , ter-
 minée à un bout par quelques bras

DES POLYPES. IV. Mém. 185
contractés. Je prens la précaution
de mouiller ma main, le pinceau, &
les moitiés de Polype qui viennent
d'être séparées, afin de ne pas risquer
de déchirer ces moitiés : ce qui pour-
roit facilement arriver sans cette pré-
caution. Après avoir examiné les
portions de Polype, je les conduis
avec le pinceau dans l'eau qui est
dans le creux de ma main, d'où je
les enleve l'une après l'autre, pour
les mettre dans un verre plat, afin
de continuer à les observer,

IL arrive la plupart du tems que
les moitiés d'un Polype coupé en
deux longitudinalement, se contour-
nent d'abord, & se roulent de diffé-
rentes manieres. Elle commencent
ordinairement à se rouler par une de
leurs extrémités, & forment alors un
rouleau fort étroit*. J'ai remarqué

* Pl. XI.
Fig. 1.

que la superficie extérieure de la peau du Polype est toujours en dedans du rouleau. Il se déroule ensuite, & la moitié de Polype, après avoir plus ou moins attendu, se forme en tuyau ;

* Fig. 7. les bords des deux côtés * se rappro-
ai, eb. chent & se réunissent. Il arrive quel-

quefois que la réunion des bords commence par le bout postérieur, & d'autres fois ils se rapprochent à peu près par tout à la fois. Lorsqu'ils se réunissent peu à peu, en commençant par un bout, on peut distinguer ordinairement la portion du Polype

* Fig. 9. qui est déjà fermée *, de celle qui
ci b. ne l'est pas encore *. Il arrive sou-

* *cae.* vent que la portion de Polype est si contournée, quand les bords commencent à se réunir, qu'on ne peut voir comment ils se rapprochent.

Ces bords, en se réunissant, se
 joignent

joignent si bien qu'on ne voit dès le premier moment aucune cicatrice à l'endroit où ils se sont réunis ; la peau du Polype est aussi unie là qu'ailleurs. C'est ce qui fait qu'aussi-tôt que la réunion des bords est achevée , le corps des moitiés de Polypes ressemble à celui d'un Polype parfait * : * Pl. XL. Fig. 10. a b. mais les têtes sont moins garnies de bras : elles n'en ont que trois ou quatre , suivant le nombre qu'en avoit le Polype qui a été partagé , & suivant que la division a été faite.

IL ne faut communément qu'une heure , & même moins , pour que la moitié d'un Polype , coupé suivant sa longueur , prenne la forme d'un Polype parfait.

QUOIQUE les portions de Polypes coupés longitudinalement en deux , n'aient que quelques bras , ils leur

suffisent pour arrêter une proie. Je fus d'abord surpris d'en voir quelques-unes qui , vingt-quatre heures après la section, saisirent & avalèrent un ver aussi long qu'elles. Mais ayant dans la suite essayé de donner à manger encore plutôt à des moitiés de Polypes , coupés suivant leur longueur , j'en ai vu qui ont mangé trois heures après la section. J'ai quelque lieu de soupçonner que les portions d'un Polype , qui n'a pas pris d'alimens depuis un certain tems, lorsqu'on le coupe , mangent plutôt après l'opération , que celles d'un Polype bien nourri.

Je viens de dire que les Polypes qui sont venus de portions de Polypes coupés longitudinalement , n'ont d'abord que quelques bras : mais en peu de jours on en voit paroître d'au-

tres , qui poussent aux endroits où il en manquoit * ; en sorte que , lorsque ces derniers sont devenus aussi longs que les autres , il n'y a absolument aucune différence entre ces Polypes , & ceux qui n'ont pas été coupés. * Fig. 10.

J'AI divisé des Polypes en quatre , suivant leur longueur , dans le même moment. Voici comment je m'y suis pris. Après avoir coupé un Polype en deux , & en avoir étendu les deux moitiés sur ma main , j'ai coupé ces deux moitiés , comme j'ai dit que je coupois le Polype entier. Ces quatre parties de Polypes coupés longitudinalement , sont devenues en peu de tems chacune un Polype complet.

L'EXTRAIT suivant de mon Journal , contient un exemple de l'expé-

N ij

fience dont il s'agit. Le 16. Août 1741. j'ai divisé en quatre, suivant sa longueur, un Polype de la seconde espece. Il avoit alors huit bras. J'ai appelé ces quatre parties, n°. 1. 2. 3. & 4.

N°. 1. avoit trois bras d'abord après la section. Il en parut un nouveau le 18. un autre le 20. un le 23. & encore un dans la suite.

N°. 2. avoit deux bras. Le 18. il en parut trois nouveaux ; le 22. un, & encore un dans la suite.

N°. 3. avoit deux bras. Le 18. il en parut trois nouveaux ; le 20. un, & encore un dans la suite.

N°. 4. avoit un bras. Le 18. il en parut trois nouveaux ; le 20. un, le 22. un, & encore un dans la suite.

Ces quatre portions du même Polype avoient chacune six bras, six

DES POLYPES. IV. Mém. 191
jours après la section , & sept le 14.
Septembre. Elles ont toutes mangé
& multiplié. Je les ai ensuite coupées
transversalement ; & l'expérience a
parfaitement réussi.

QUAND on coupe longitudina-
lement des Polypes qui poussent des
petits , ces petits continuent à croî-
tre après la section.

J'AI fait sur le même Polype , &
en même-tems les deux Expériences
dont il a été question jusqu'à présent ,
c'est-à-dire , que je l'ai coupé dans le
même tems transversalement & sui-
vant sa longueur ; je l'ai en quelque
maniere écartelé. Les quatre parties
de ce Polype sont devenues des Po-
lypes complets : il s'est fait pour cela
dans chacune d'elles ce que j'ai dit
qui se faisoit dans les portions d'un
Polype coupé en long & dans celles

N. iij

d'un Polype dont on a fait la coupe transversale. Les deux premières parties du Polype écartelé, celles dont le bout antérieur étoit garnie de quelques bras, se sont premièrement disposées en tuyau, en rapprochant & en réunissant leurs bords ; & en second lieu, leur bout postérieur a pris la forme de celui d'un Polype qui n'a jamais été coupé. Les deux secondes parties, après avoir rapproché leurs bords, & s'être disposées en tuyau, se sont trouvées dans l'état de la seconde moitié d'un Polype qui a été coupé transversalement depuis peu ; & il s'est fait ensuite en elles, tout ce qui se fait dans une pareille moitié.

LORSQUE les quatre Polypes qui sont venus de celui qui avoit été écartelé, ont pu manger, je les ai nourris. J'en ai ensuite écartelé un : j'en ai

- fait quatre Polypes ; & au bout de quelque tems , j'ai encore fait la même opération sur un de ces quatre Polypes. J'ai nourri & vu multiplier pendant deux ans , ces quatre derniers Polypes.

J'AI coupé en partie un Polype suivant sa longueur , en commençant par la tête ; & il s'est trouvé ensuite avoir deux corps , deux têtes , & une queue. Les portions du Polype qui ont été séparées , au lieu de se rapprocher , & de former un Polype simple , formerent chacune à part une tête & un corps , comme j'ai dit que le faisoient les moitiés d'un Polype coupé longitudinalement d'un bout à l'autre. Après avoir nourri ce Polype à deux têtes , en lui faisant prendre des alimens par ses deux bouches , j'ai aussi fendu en

partie , en commençant par la tête ;
chacune des deux branches qu'il
avoit. En peu de tems il a eu quatre
têtes. Enfin , je suis parvenu à faire

* Pl. XI. en sorte qu'il eût sept têtes *. Un au-

Fig. II.

tre sur lequel j'ai fait la même expé-
rience , en a eu huit. J'ai vu ces Hy-
dres prendre en même tems des ali-
mens par toutes leurs bouches.

ON pense bien qu'après être par-
venu à faire des Hydres , je ne m'en
fuis pas tenu là. J'ai coupé les têtes
de celui qui en avoit sept ; & au bout
de quelques jours , j'ai vu en lui un
prodige qui ne le cede gueres au
prodige fabuleux de l'Hydre de Ler-
ne. Il lui est venu sept nouvelles têtes ;
& si j'avois continué à les cou-
per à mesure qu'elles pouffoient , il
n'y a pas à douter que je n'en eusse
vu pousser d'autres. Mais voici plus

que la Fable n'a osé inventer. Les sept têtes que j'ai coupées à cette Hydre ayant été nourries, sont devenues des animaux parfaits, de chacun desquels il ne tenoit qu'à moi de faire une Hydre.

Si l'on commence par le bout postérieur à couper un Polype longitudinalement, & si l'on ne le coupe que jusques près de la tête, il se trouve peu après avoir une tête & deux queues. On peut augmenter le nombre de ces queues en les recoupant, après les avoir fait croître, comme j'ai dit que je l'avois fait à l'égard des Hydres à plusieurs têtes.

J'AI vu marcher des Hydres à plusieurs têtes, & des Hydres à plusieurs queues.

J'AI fait des Hydres d'une manière un peu différente de celle que je

viens de décrire. Au lieu de fendre le Polype en long jusques près d'une des extrémités , je l'ouvre d'un bout à l'autre , & je l'étais sur ma main ainsi ouvert. On a vu dans le

* *Tome I.* premier Mémoire * , comment je

pag 112.

& *suiv.*

m'y prens pour faire cette opération : & la Figure. 7. de la Pl. IV. de ce Mémoire, représente grossi au microscope un Polype ouvert , & dont la peau est étendue. Je donne des coups de ciseaux à la peau de tous côtés , & en tout sens : j'ai seulement soin de ne pas séparer entièrement les portions de cette peau , de faire en sorte qu'elles tiennent encore ensemble par quelque endroit. On s'imagine bien dans quel état est après cela le Polype. J'en ai souvent vu que j'avois coupés de cette manière , qui ont eu ensuite trois ou

quatre têtes. Ils ont aussi quelquefois des queues. Ces petits morceaux de peau, qui ne tiennent plus ensemble que par un côté, deviennent chacun ordinairement ou une tête, ou une queue. Il se peut aussi qu'il y en ait qui se rejoignent. C'est ce que je n'ai pas observé.

IL arrive la plupart du tems que les têtes & les queues des Polypes extraordinaires dont je viens de parler, se séparent d'elles-mêmes, & deviennent des Polypes parfaits. J'ai nourri pendant six semaines une Hydre à sept têtes, avant qu'aucune de ses têtes se soit séparée.

LORSQU'ON nourrit bien les Polypes à plusieurs têtes, & ceux à plusieurs queues, ils multiplient comme les Polypes ordinaires.

LA dernière expérience que je

viens de rapporter , celle du Polype-ouvert d'un bout à l'autre , auquel j'ai donné plusieurs coups de ciseaux , a déjà pu faire comprendre , que de quelque maniere , & en quelquel sens que l'on coupe un Polype , on ne le tue point , & qu'au contraire on en fait plusieurs d'un seul. Afin de m'assurer davantage de ce fait , j'ai poussé plus loin l'opération dont je viens de parler. J'ai ouvert sur ma main un Polype , je l'ai étendu , & j'ai coupé en tout sens la peau simple qu'il formoit, je l'ai réduit en petits morceaux , je l'ai en quelque maniere haché. Ces petits morceaux de peau , tant ceux qui avoient des bras , que ceux qui n'en avoient point , sont devenus des Polypes parfaits. Il arrive quelquefois cependant qu'on en voit mourir quelques-

uns. Cela vient peut-être de ce qu'ils sont trop petits : peut-être aussi cela vient-il d'accidens qui auroient fait périr un Polype entier.

ON doit observer avec soin les morceaux de peau dont je parle. Il faut les considérer souvent ; & quand ils commencent à être en état de manger , il faut leur donner des portions de vers extrêmement petites. Mais c'est sur-tout en les changeant d'eau , qu'il faut prendre des précautions ; sans quoi on risqueroit de les perdre.

J'AI répété plusieurs fois avec succès cette expérience.

TOUT Polype qui vient de la portion d'un Polype coupé en deux , ou en plusieurs parties , de quelque manière que ce soit , a toujours , comme ceux qui n'ont jamais été partagés ,

un canal qui regne du bout antérieur jusqu'au bout postérieur ; c'est-à-dire , qu'il a toujours un estomac. J'ai été pendant long-tems embarrassé de savoir comment cet estomac se forme dans les Polypes qui viennent d'un fort petit morceau de peau simple , étroit & court , & même dans ceux qui viennent d'un Polype coupé longitudinalement en quatre ou en cinq parties , c'est-à-dire , dans les Polypes qui , d'abord après la section , ne font que des morceaux de peau , simples , minces & longs à proportion de leur épaisseur. On voit facilement que les morceaux d'un Polype , dont on a fait la coupe transversale , quelque petits qu'ils soient , forment toujours une sorte de tuyau , fort court à la vérité , mais qui s'allonge à mesure que ces morceaux de Polype

s'étendent. Les portions d'un Polype coupé en deux suivant sa longueur, sont encore assez larges pour que les bords des deux côtés opposés puissent se rapprocher, & pour que chacun de ces deux morceaux, qui d'abord n'étoit, si je puis parler ainsi, qu'un demi-tuyau, deviennent ensuite un tuyau entier. C'est ce que j'ai vu très-souvent, comme je l'ai dit ci-dessus. Mais en est-il de même, par exemple, des portions d'un Polype coupé longitudinalement en un ou plus grand nombre de parties, qui sont fort étroites? J'ai été pendant long-tems dans le doute là-dessus. Une portion de Polype qui avoit été coupé en long, m'avoit paru être devenue un Polype complet, sans que ses bords se fussent rapprochés & réunis. J'avois eu lieu de

croire que ce morceau de peau s'étoit simplement renflé , & avoit pris par ce moyen la forme d'un Polype. Mais je n'avois vu cela qu'une fois , & pas assez distinctement pour pouvoir fonder une décision là-dessus. J'ai donc travaillé à répéter la même expérience.

J'AI d'abord commencé par observer des morceaux fort étroits , de Polypes coupés suivant leur longueur. J'ai mis ces portions de Polypes dans des verres peu profonds , où je pouvois les observer avec une forte loupe. Il importe beaucoup de les examiner souvent , sur-tout dans les deux premières heures après qu'elles ont été coupées , afin de bien remarquer les différentes formes qu'elles prennent , & de pouvoir s'assurer que les bords des deux côtés opposés,

ne se sont pas rapprochés & réunis. Je vais donc décrire ce que j'ai vu plusieurs fois de suite ; car j'ai répété souvent la même expérience pour plus de sûreté.

UNE portion fort étroite d'un Polype coupé longitudinalement, commence ordinairement par se rouler de la même manière que j'ai dit que se rouloient celles qui sont plus larges. Elle forme un rouleau très-mince, & commence toujours à se rouler par l'un de ses deux bouts ; & celui par lequel elle commence, se trouve au milieu du rouleau, qui, comme on le peut juger, n'a pas beaucoup de tours ; souvent même il n'en a qu'un : la portion de Polype forme un cercle, ses deux bouts se touchent. Elle se déroule ensuite. J'en ai vu qui se rouloient & se dé-

Tome II.

O

rouloient alternativement deux ou trois fois dans les premières heures après l'opération. Il y en a aussi qui s'étendent d'abord , & qui restent étendues. En observant souvent un pareil morceau de Polype , & en n'oubliant jamais , après avoir cessé de l'observer , la situation dans laquelle on l'a laissé , il est facile de s'assurer qu'il ne s'est point formé en gouttière d'un bout à l'autre , & que ses côtés ne se sont pas rapprochés & réunis ; en un mot , qu'il n'a point pris la forme d'un tuyau. J'en ai vu qui , je suis sûr , ne l'ont jamais prise. Ces portions de Polypes se font peu à peu renflées. Elles étoient d'abord étroites & plates , & ensuite en se renflant elles sont devenues à peu près cylindriques. Lorsqu'on en observe avec une loupe , au grand

jour, ou à la lumière d'une bougie, quand elles sont dans ce dernier état, on peut s'appercevoir qu'elles ont déjà dans leur intérieur un vuide qui regne d'un bout à l'autre : mais on a dans la suite occasion de s'en assurer davantage. Il se forme une tête à une des extrémités de ces portions de Polypes, & elles sont en peu de jours en état de manger de petits morceaux de vers. On les voit entrer dans leur corps, & on remarque facilement que ces morceaux de vers occupent la capacité du vuide qui s'est formé dans l'intérieur des portions de Polypes. Enfin elles deviennent des animaux parfaits.

La manière dont se forme l'estomac de ces portions de Polypes, n'est pas le seul fait remarquable qu'elles nous présentent. La superficie exté-

rière de leur peau , est aussi très-digne d'attention. Il est aisé de comprendre qu'un côté de la superficie d'un morceau de peau de Polype , est une partie de la superficie intérieure de la peau du Polype , des parois de son estomac. Lors donc que le morceau de peau ne se forme point en tuyau , mais qu'il se renfle simplement pour devenir un Polype , ce côté de la superficie qui étoit avant la section une partie de la superficie intérieure de la peau du Polype entier , devient une partie de la superficie extérieure de la peau du nouveau Polype.

Je rapporterai l'extrait d'un seul article de mon Journal , touchant ces morceaux de Polypes dont je viens de parler.

J'AI coupé le premier Novembre

1743. un Polype suivant sa longueur en plusieurs parties , entre une & deux heures de l'après-midi. Voici les observations que j'ai faites sur une d'elles.

Ce morceau de peau étoit assez long , & fort étroit. Il s'est un peu roulé. J'ai vu distinctement , en l'observant de suite , que les bords ne se sont pas rejoints. Il avoit déjà pris à quatre heures & demie une forme cylindrique , c'est-à-dire , qu'il s'étoit déjà sensiblement renflé. Il n'avoit point de bras. Le 3. Novembre il a paru , à quelque distance de son extrémité la plus pointue , une excrescence qui ressembloit à un bouton du jeune Polype. J'ai remarqué le 4. que c'en étoit un en effet. Il sortoit même des bras du bout antérieur de ce jeune , aussi-bien que de celui de la

mere , c'est-à-dire , de la portion de Polype. Celle-ci a ensuite mangé & multiplié.

J'AI aussi observé de suite de fort petits morceaux de peau courts & étroits , & tels même qu'il étoit en quelque maniere impossible qu'ils se repliaissent pour prendre la forme d'un tuyau. Ils s'enflent , ils deviennent ronds , ou à peu près , & forment un grain vuide en dedans , qui pousse ensuite des bras à un endroit de sa superficie , au milieu desquels est la bouche , ils marchent ensuite , ils s'allongent , & sont enfin des Polypes parfaits.

J'EN viens à présent à une expérience , qui ne le cede pas en singularité à celles dont il a été question jusqu'à présent. Cette expérience consiste à retourner des Polypes.

ON doit se rappeler encore ici que tout le corps d'un Polype ne forme qu'un tuyau , qu'une sorte de boyau ou de sac , qui va d'une de ses extrémités à l'autre. Il s'agit donc de retourner ce boyau que forme le corps d'un Polype , comme on retourne un sac , un bas, un gant , ou le doigt d'un gant ; de faire en sorte que la superficie intérieure de sa peau devienne la superficie extérieure , & que l'extérieure devienne l'intérieure.

SI j'avois su qu'un morceau de peau de Polype pouvoit devenir un Polype complet , seulement en s'enflant de maniere qu'il se forme dans le milieu de cette peau simple un vuide qui devient l'estomac du Polype ; si , dis-je , j'avois su cela , j'aurois eu plus d'espérance de voir vivre un Polype retourné ; j'aurois déjà eu

O.iiiij.

une preuve que la superficie intérieure de la peau d'un Polype, peut devenir, au moins en partie, superficie extérieure, ainsi qu'on l'a vu dans les expériences précédentes. Mais lorsque j'entrepris de retourner des Polypes, je n'avois pas encore fait ces expériences.

J'AI pensé à retourner des Polypes, après avoir remarqué un fait qui se trouve détaillé dans le second Mé-

* Tom. I. moire * : savoir, que les grains ou
 pag. 274.
 & suiv. vesicules, dont toute la peau de

ces animaux est garnie, se remplissent de suc nourricier. Il me vint dans l'esprit que si les vesicules qui étoient à la superficie extérieure de la peau, se trouvoient les plus près de ce suc nourricier, elles s'en rempliroient les premières, & que le Polype se nourriroit, peut-être, aussi.

bien que lorsque le suc nourricier passe d'abord dans les vésicules qui tapissent les parois de l'estomac.

LA première idée qui me vint , fut de mettre un Polype dans une liqueur qui pût être regardée , par rapport à lui , comme un suc nourricier , afin de voir s'il ne tireroit point alors sa nourriture par toutes les parties extérieures de son corps , comme M. le Comte de Marfigli dit dans son *Histoire de la Mer* , que font plusieurs plantes marines. Il rapporte qu'elles sont toutes pleines de glandules ou vésicules , & qu'elles tirent extérieurement de l'eau de la mer qui les touche , le suc qui sert à les nourrir. Il est vrai que les découvertes faites depuis peu sur ces prétendues plantes marines , changent beaucoup ce système : mais elles n'étoient pas encore

faites au mois de Juillet 1741. lorsque je pensai à faire sur les Polypes l'expérience dont je parle.

N'AYANT pu parvenir à trouver un suc dans lequel je pusse mettre les Polypes , & qui pût servir à les nourrir , je pensai à les retourner , afin de faire en sorte que la superficie extérieure de leur peau , formât les parois de leur estomac. Je me flatai très-peu de voir réussir cette expérience : mais je crus cependant qu'il ne convenoit pas de négliger de l'entreprendre.

J'ESSAYAI pour la première fois de retourner des Polypes dans le mois de Juillet 1741. mais ce fut inutilement que j'employai , pour y parvenir , tous les moyens auxquels je pensai alors. Je fus plus heureux l'année suivante , ayant trouvé enfin un

expédient qui est assez facile.

TANT que j'ai voulu retourner des Polypes dont l'estomac étoit vuide, je n'ai jamais pu en venir à bout; & j'ai au contraire d'abord réussi, dès que je leur ai bien donné à manger avant que de leur faire cette opération; c'est-à-dire, dès que j'ai fait en sorte que leur corps se soit fort élargi. Il importe en effet, pour qu'elle ait un heureux succès, que l'estomac & la bouche du Polype soient fort élargis. J'employai d'abord pour cela de ces Vers rouges de Tipules, dont j'ai parlé dans le second Mémoire *. Je me suis aussi ^{* Tome I. pag. 212.} servi avec succès des mêmes vers dont j'ai nourri ordinairement les Polypes en Hiver *.

* PL. VII.
Fig. 2.

CE sont les Polypes de la seconde espèce que j'ai retourné les premiers.

JE commence donc par donner un ver au Polype sur lequel je veux faire cette expérience ; & quand ce ver est avalé , je puis la commencer. Il ne convient pas d'attendre qu'il soit beaucoup digéré. Je mets le Polype , dont l'estomac est bien rempli , dans un peu d'eau dans le creux de ma main gauche : je le presse ensuite avec un petit pinceau , plus près de l'extrémité postérieure que de l'antérieure : je pousse de cette manière contre la bouche du Polype , le ver qui est dans l'estomac ; il la force à s'ouvrir , & en pressant encore un peu le Polype avec mon pinceau , je

* PL. XI. fais sortir le ver * en partie par sa
Fig. 12.
f. c. bouche * , & je vuide d'autant le
* bout postérieur de son estomac. Ce
ver qui sort de la bouche du Polype ,
la force à s'élargir considérablement ,

sur-tout s'il fort en double, comme
 on le voit dans la Figure que je viens
 d'indiquer. Lorsque le Polype est
 dans cet état, je le conduis dou-
 cement, sans rien déranger, hors
 de l'eau, & je le place sur le bord
 de ma main, qui est simplement
 mouillé, pour que le Polype ne s'y
 colle pas trop : je le force à se con-
 tracter de plus en plus, & je contri-
 bue par cela même à faire élargir
 l'estomac & la bouche. On doit se
 rappeler ici que le ver fort en partie
 de cette bouche, & la tient ouver-
 te *. Je prens ensuite de la main droi- * Fig. 12.
 te une soie de sanglier ou de porc,
 assez épaisse & sans pointe, & je la
 tiens, comme on tient une lancette
 pour saigner. J'approche son plus
 gros bout * de l'extrémité postérieure * 6.
 re du Polype ; je pousse cette extré-

mité, & je la fais rentrer dans l'estomac du Polype, d'autant plus facilement, qu'il est vuide dans cet endroit-là, & fort élargi. Je continue ensuite à faire avancer le bout de soie de sanglier, qui, à mesure qu'il avance, retourne de plus en plus le Polype. Quand il parvient au ver qui tient la bouche ouverte, il pousse ce ver, ou passe à côté, & sort enfin par cette bouche, couvert de la partie postérieure du Polype qui est re-

* Pl. XI.
Fig. 14.
a b.

tournée *. Il est facile de ne pas manquer la bouche, parce qu'elle est fort ouverte. Il arrive quelquefois que le Polype se trouve d'abord entièrement retourné. On conçoit qu'il couvre alors le bout de soie de sanglier *, qui est logé dans le Polype retourné *; que la superficie extérieure du Polype, est devenue inté-

Fig. 13.
b.

* a b.

rière ; que cette superficie touche celle de la soie de sanglier, & que l'intérieure est devenue extérieure.

LORSQU'UN Polype est hors de l'eau, il est difficile de distinguer ses différentes parties ; tout est confus : ainsi le Polype retourné qui est hors de l'eau, & au bout de la soie de porc, ne peut se distinguer d'un Polype non retourné. Pour m'assurer davantage du succès de mon opération, je prens de la main gauche la soie de sanglier que je tenois avec la main droite, par le bout opposé à celui où est le Polype ; & de la droite je tiens une loupe. Je mets ensuite le Polype dans l'eau d'un petit verre, préparé d'avance. Tout redevient distinct. Je juge facilement, en examinant la peau du Polype, s'il est retourné, c'est-à-dire, si c'est bien la

superficie intérieure de cette peau qui est en-dehors. Mais j'en ai ordinairement encore une autre preuve.

IL est rare que le Polype soit entièrement retourné, par le mouvement qui sert à faire sortir par la bouche la partie postérieure retournée : ainsi quand on le met dans l'eau, lorsqu'il est au bout de la soie de sanglier, on trouve la plupart du tems que cette

* Pl. XI. partie postérieure retournée * sort de
Fig. 14.
a b. * a. la bouche * ; mais on voit une partie

du Polype qui n'est pas retournée,
* a c. savoir, son bout antérieur *, celui

qui est terminé par les bras : il est replié sur le bout retourné. Pour achever de retourner le Polype, je prens de la main droite un pinceau, pendant que je tiens toujours dans l'eau le bout de la soie de sanglier qui est couvert par ce Polype. Je passe délicatement

catement le bout du pinceau sur la partie non retournée *, dans le sens ^{* Fig. 14.} nécessaire pour la faire retourner, ^{a. c.} savoir, de *a* en *c*. C'est ce qui est exécuté dans un instant. Je puis en juger à l'œil en opérant ; & dès que j'ai fini, je reprends une loupe, & j'examine de nouveau le Polype. Quand il se trouve bien retourné *, il ne ^{* Fig. 13.} s'agit plus que de l'ôter du bout de la ^{a. b.} soie de sanglier *. Je le tiens pour ^{* d. b.} cet effet dans l'eau, je le pousse doucement de *a* en *b* avec un pinceau ; & il tombe au fond du verre sans se déranger.

J'AI fait tout ce que je viens de décrire en présence de différentes personnes accoutumées à observer, & qui ont toujours eu l'œil aidé d'une loupe, & fixé sur le Polype pendant que je le retournois,

D'ABORD après qu'il est retourné ,
 la bouche se ferme , & ses levres ren-
 trent même un peu en dedans *. Les
 *Fig. 15. bras paroissent alors réunis en un
 " faisceau * plus ou moins ferré , qui
 *ac. sort du milieu du bout antérieur * du
 *a. Polype : mais ensuite les levres se
 renversent au contraire en - dehors ,
 comme si le Polype vouloit se dé-
 retourner (qu'on me permette cette
 nouvelle expression) c'est - à - dire ,
 se remettre , comme il étoit avant
 que d'être retourné.

C'EST en effet ce qu'il tente , & à
 quoi il réussit souvent. J'ai vu des
 Polypes qui se sont déretournés en
 moins d'une heure. D'autres n'y sont
 parvenus qu'environ vingt - quatre
 heures après avoir souffert cette opé-
 ration.

LES Polypes qui se déretournent ,

se portent ensuite fort bien : ils mangent , croissent , multiplient , en un mot , on ne sauroit les distinguer des autres.

Il est déjà bien singulier qu'un animal puisse avoir été retourné & déretourné , sans en mourir , & même sans en paroître incommodé. Mais cela ne me suffisoit pas : mon but principal , en retournant des Polyppes , étoit de les conserver retournés , & de voir s'ils pourroient vivre dans cet état. J'ai donc travaillé à faire en sorte qu'ils restassent retournés. Il m'a suffi , à l'égard de quelques-uns , d'abaisser leurs levres avec la pointe d'un pinceau , à mesure qu'elles se renversoient sur le corps. Mais il est trop rare de réussir à souhait par ce moyen , pour s'en tenir là quand on se propose de réitérer souvent l'expé-

rience. J'ai eu recours à un expédient plus sûr : ç'a été d'embrocher les Polypes retournés , avec une soie de porc ou de sanglier , près du bout antérieur. Voici comment je m'y prens.

APRES avoir achevé de retourner un Polype , je le remets dans le creux de ma main gauche , qui est en partie plein d'eau ; j'examine encore ce Polype à la loupe ; puis je le conduis avec un pinceau , & je le range sur ma main au bord de l'eau , je l'étens (du mieux qu'il m'est possible , & j'étudie bien sa situation. Ensuite je prens de la main droite une soie de sanglier assez fine , qui est nouée d'un

* Pl. XI.
Fig. 16.
ø.

côté : je la tiens près de sa pointe * , & je la plante dans le corps du Polype retourné , assez près de ses lèvres : elle les perce , & pousse la

peau de ma main qui est en dessous.
 Alors je penche la main, de sorte
 que l'eau qui est dans le creux, vient
 baigner le Polype; il en est soulevé,
 & cela même fait qu'il s'embroche
 mieux. Dans ce moment-là, je laisse
 tomber doucement sur ma main l'autre
 bout * de la soie de sanglier, je *
 reprends le pinceau, je pousse avec
 son bout le Polype vers le milieu de
 la soie de sanglier *, & quand il y *
 est, j'enleve cette soie avec le Poly-
 pe, & je la mets dans un verre *, *
 ayant soin de faire en sorte qu'elle ne
 le touche que par ses extrémités *, *
 afin que le Polype étant éloigné du
 fond & des côtés, ne puisse pas s'y
 appuyer, & faire de grands efforts
 pour se desembrocher de manière ou
 d'autre. Je mets le noeud *, qui est *
 à la soie de sanglier, vers le bas, afin

que , si le Polype glisse , s'il tombe par son propre poids , il soit arrêté par ce nœud , & ne se desembroche pas.

CE n'est rien pour un Polype que d'être embroché. Je l'ai éprouvé de différentes manieres sur des Polypes non retournés , sans que cela les empêchât de manger & de multiplier. Les Polypes retournés ne paroissent pas non plus en souffrir.

IL est facile de comprendre comment la soie de sanglier , qui traverse leur corps près de la bouche , les empêche de se déretourner.

J'AI retourné un nombre considérable de Polypes de la seconde espece , qui sont restés retournés , & qui ont long-tems vécu. Ils ont mangé , crû , & multiplié.

IL arrive souvent que les Polypes

qu'on retourne & qu'on embroche pour les empêcher de se déretourner, se déchirent un peu les levres, & que par - là il se forme deux têtes. D'abord ces têtes n'ont point de col : mais il leur en vient un lorsque le Polype retourné croît ; & alors il ressemble à un Polype qu'on auroit coupé en partie suivant sa longueur, en commençant par la tête.

J'AI eu plusieurs Polypes retournés, qui n'ont eu qu'une tête après l'opération, & dont la bouche étoit précisément la même bouche qu'ils avoient avant que d'être retournés.

J'AI nourri plusieurs petits, produits par des Polypes retournés ; & je les ai vus multiplier.

LES premiers Polypes que j'ai retournés, n'avoient point de petits attachés à leur corps : mais dans la

fuite , j'en ai retourné plusieurs qui en avoient. Ces petits se trouvent après l'opération , en dedans du Polype. S'ils sont déjà avancés , si l'endroit par lequel ils tiennent à la mere , est déjà fort étranglé , ils s'en détachent en peu de tems , c'est-à-dire , au bout d'un jour ou deux : mais en attendant qu'ils se séparent , ils s'étendent dans l'estomac de leur mere retournée , & l'on voit leur tête & une partie de leur corps qui sort par la bouche. J'ai ordinairement séparé avant l'opération , les petits déjà fort avancés , qui sortoient des meres que je voulois retourner. Ils ne font qu'embarrasser. Mais il n'en est pas de même de ceux qui sont moins avancés , de ceux qui n'ont pas encore de bras , ou qui n'en ont que de fort courts , & dont le bout

postérieur ne s'est pas encore rétréci : l'ouverture de communication qui est entre l'estomac de ces petits & celui de leur mere , est encore dans toute sa grandeur. Lorsque la mere est retournée , le jeune peut se retourner de lui-même ; & c'est ce qu'il fait. Il arrive alors précisément ce qui arriveroit , si après avoir retourné un gant , les doigts de ce gant se retournoient d'eux-mêmes. Si on observe avec attention le corps de la mere , d'abord après qu'elle a été retournée , on voit à l'endroit où tient un de ces jeunes dont je parle , un creux qui peu à peu se remplit ; après quoi on distingue sensiblement le corps du jeune Polype , qui en sort en se retournant. C'est ce que j'ai vu plusieurs fois , & avec un très-grand plaisir. Il ne faut que quel-

ques minutes pour que le petit Polype soit tout-à-fait retourné. Ensuite il continue à croître , il se détache de sa mere , & ne differe en rien de tout autre Polype. J'ai nourri de pareils jeunes : & eux & leurs petits ont multiplié dans mes verres.

ON conçoit bien que les bras des Polypes qu'on retourne , ne se retournent pas : ils se trouvent d'abord un peu en dedans , au lieu qu'auparavant ils étoient un peu en dehors ; mais en peu de tems ils se disposent comme ceux des Polypes qui n'ont pas été retournés.

C'EST en observant un Polype , d'abord après qu'il avoit été retourné , que j'ai vu l'ouverture que chaque bras a à son origine , dont j'ai

* *Tome I.* parlé dans le second Mémoire * , &
 pag 262. par le moyen de laquelle le tuyau

DES POLYPPES. IV. Mém. 229
qu'il forme, communique avec l'estomac. On doit chercher ces ouvertures un peu au dessous des bords de la bouche d'un Polype nouvellement retourné. Si l'on se sert d'une forte loupe, on voit sur la peau de petits enfoncemens très-sensibles. Leur situation & leur nombre ne permettent pas de douter que ce ne soient les ouvertures des bras des Polypes. Si on continue à observer ces ouvertures, on les voit diminuer peu à peu, & enfin disparaître. Les mouvemens & les renflemens de la peau du Polype, les cachent ou les ferment. Sans doute qu'il se forme d'autres ouvertures en dedans de la bouche.

La superficie extérieure d'un Polype nouvellement retourné; n'est pas d'abord aussi unie que celle d'un

Polype non retourné. Elle est telle que j'ai décrit dans le premier Mémoire * ; la superficie intérieure de la peau des Polypes. Il arrive même la plupart du tems , que plusieurs des grains qui tapissent cette superficie extérieure d'un Polype retourné , se détachent : elle paroît pendant quelques jours environnée de ces grains qui s'en séparent : mais ensuite elle devient absolument aussi unie que l'est la superficie extérieure des Polypes qui n'ont pas été retournés.

* *Tome I.*
Pag. 114.

J'AI vu un Polype retourné , qui a mangé un petit ver deux jours après l'opération. Les autres n'ont pas mangé si-tôt. Ils ont été quatre ou cinq jours , plus ou moins , sans vouloir manger. Ensuite ils ont tous autant mangé que les Polypes qui n'ont pas été retournés.

J'AI nourri un Polype retourné pendant plus de deux années. Il a beaucoup multiplié.

J'AI aussi retourné des Polypes de la troisième espèce.

DES que j'eus retourné des Polypes avec succès , je m'empressai à faire cette expérience en présence de bons Juges , afin de pouvoir citer d'autres témoignages que le mien , pour prouver la vérité d'un fait aussi étrange , que celui qu'elle m'a fait connoître. Je témoignai aussi souhaiter que d'autres entreprissent de retourner des Polypes. M. Allamand , que j'en priai , mit d'abord la main à l'œuvre , & avec le même succès que moi. Il a retourné plusieurs Polypes , il a fait en sorte qu'ils restassent retournés , & ils ont continué à vivre. Il a plus fait : il a retourné des Po-

lypes qu'il avoit déjà retournés quelque tems auparavant. Il a attendu de faire sur eux cette opération pour la seconde fois, qu'ils eussent mangé après la premiere. M. Allamand les a aussi vus manger après la seconde opération. Enfin, il en a même retourné un pour la troisieme fois, qui a vécu quelques jours, & est ensuite péri sans avoir mangé; mais peut-être sa mort n'est-elle point la suite de cette opération.

APRES que M. Allamand m'eut appris qu'il avoit réussi à retourner des Polypes pour la seconde fois, j'entrepris de faire la même expérience sur deux de ces animaux, & j'eus le même succès que lui.

NON content d'avoir coupé des Polypes de différentes manieres, & d'en avoir retourné, j'ai voulu es-

ſayer ſi ces différentes expériences réuſſiroient ſur le même Polype. J'en ai coupé un en deux, tranſverſalement ; j'ai enſuite retourné ces moitiés lorsqu'elles ont été des Polypes parfaits. Je les ai vus manger & multiplier, après avoir été retournés. J'ai fait la même expérience, & avec le même ſuccès ſur les moitiés d'un Polype, coupé en deux ſuivant ſa longueur. Enfin, j'ai coupé deux Polypes retournés, qui étoient venus des moitiés d'un même Polype, & j'ai vu les portions de ces Polypes, premièrement coupés, enſuite retournés, & après cela coupés de nouveau ; j'ai vu, diſ-je, les portions de ces Polypes, devenir des Polypes parfaits.

LE Polype de forme ſingulière qui eſt représenté dans la Figure 11. de

la Planche XIII. est venu d'un Polype retourné imparfaitement. L'opération n'ayant pas bien réussi, je donnai un coup de ciseaux à ce Polype. Une partie fut séparée de l'autre, & c'est une de ces parties qui, environ au bout de deux mois, étoit telle qu'elle est représentée dans cette Figure, après avoir fait plusieurs repas.

J'AI dit ci-dessus que la plupart des Polypes retournés, entreprennent de se déretourner, & que même ils peuvent en venir à bout : je dois ajouter ici, que tous ceux qui se déretournent, ne se déretournent pas entièrement. C'est ce que j'ai eu occasion de voir, peu après avoir réussi à retourner des Polypes ; & dans la suite j'en ai retourné exprès, pour pouvoir observer ceux qui ne se déretourneront

déretourneroient qu'en partie.

DES que j'en eus vu quelques-uns dans cet état extraordinaire, je fus très-curieux de savoir ce qu'ils deviendroient : & certainement ils ne méritent pas moins d'attention que ceux qui restent parfaitement retournés. Ces derniers * ont toujours une ^{* Pl. XI.} bouche à leur extrémité antérieure *, ^{Fig. 16.} c'est la même bouche que celle qu'ils ^{a b.} avoient avant que d'être retournés. ^{* 4.} elle est formée par les mêmes levres, garnies des mêmes bras : toute la différence qu'il y a, c'est que le côté de la peau qui étoit en dehors, se trouve en dedans, & que celui qui étoit en dedans, se trouve en dehors. Il en est tout autrement d'un Polype déretourné en partie. Ses levres, après qu'il a été retourné, se sont renversées sur le corps, la partie an-

- térieure du corps s'est même renver-
 Fig. 17. sée sur une partie du reste *, la peau
 qui forme cette partie antérieure ,
 s'est appliquée sur l'autre , elle s'y est
 enfin attachée , & a fait à l'extrémité
 antérieure du Polype une espece de
 * a. bourlet * , formé de la portion dé-
 retournée , & d'une portion non dé-
 retournée qui est en dedans. Le
 * a. b. reste du corps * , la partie postérieure
 de ce Polype extraordinaire , est
 encore retournée , & demeure telle.
 * a. Les levres * qui formoient la bou-
 che du Polype , ne sont plus à son
 extrémité antérieure , elles se trou-
 vent plus ou moins près de l'une ou
 de l'autre extrémité , suivant que le
 Polype s'est plus ou moins déretour-
 né ; ce qui varie beaucoup. Ces le-
 * a. vres * sont attachées autour de la
 portion du corps qui ne s'est pas dé-

retournée. La bouche qu'elles forment, si tant est que cela puisse encore s'appeler une bouche, est remplie par cette portion du corps non déretournée qui passe par cette bouche. Les bras qui sortent de ses bords, sont alors situés d'une manière fort extraordinaire; & ne paroissent plus propres à rapprocher des proies du bout antérieur du Polype: ils varient beaucoup leur direction; quelquefois ils sont dirigés vers l'extrémité postérieure du Polype*; mais ils se recourbent plus souvent vers le bout antérieur*.

* Pl. XI:
Fig. 17.

* Fig. 18.

CE fut, à me mettre bien au fait de l'état de ces Polypes déretournés en partie, que je m'occupai d'abord; & plus j'approfondis la situation singulière dans laquelle ils étoient, plus je fus impatient de savoir ce qu'ils

Q ij

deviendroient. Comment mangeraient-ils ? Ce fut la première question que je me fis. Leur extrémité antérieure *

^{17. c.} * Fig. ^{a.} rieuse *, formée par les bords de la

^{a.} portion renversée *, pouvoit être restée ouverte, comme elle l'étoit certainement peu après que le Polype s'étoit mis dans cette situation singulière ; cette ouverture pouvoit servir de bouche. Il falloit pour cela qu'il vînt des bras autour de ses bords. C'est ce qui me parut d'abord le plus vraisemblable : mais j'eus bientôt lieu de penser qu'il n'en seroit rien. Etant parvenu à observer avec une forte loupe le bout antérieur de quelques Polypes qui étoient depuis quelques jours déretournés en partie , je remarquai qu'il étoit entièrement fermé ; non simplement comme l'est souvent la bouche des Poly-

DES POLYPES. IV. *Mém.* 239
 pes ordinaires, mais de maniere à
 faire croire qu'il ne pouvoit pas s'ou-
 vrir, qu'il n'y avoit point de bou-
 che. Je ne fus ensuite pas long-tems
 à apprendre comment ces Polypes
 pourroient manger. En les obser-
 vant avec attention, je remarquai
 de nouveaux bras qui pouissoient
 près des anciens, & je vis une, &
 même plusieurs bouches qui se for-
 moient à peu près au milieu du
 corps de ces Polypes, savoir, près
 de l'endroit où leurs levres s'étoient
 attachées à leur corps *. Je vis les
 levres de ces bouches disposées en
 mamelon conique; & c'est sur-tout
 à quoi je les reconnus. Voilà donc
 des Polypes sur les côtés desquels il
 se forme une ou plusieurs bouches;
 il vient des bras autour de ces bou-
 ches; en un mot elles ressembtent

* Pl. XI.
 Fig. 17.

Q iij

parfaitement à celles des Polypes ordinaires.

ON pourroit peut-être soupçonner que ces bouches qui se forment sur les côtés des Polypes, déretournés en partie, ne sont pas véritablement de simples bouches, mais de jeunes Polypes qui sortent de ces côtés. J'ose assurer que ce ne sont pas des jeunes. Je me fonde sur des expériences suivies, dont on va voir des exemples. J'ai vu de ces bouches se former si près des anciennes levres * du Polype, qu'un côté de leurs levres étoit garni d'une partie des anciens bras, & l'autre de quelques nouveaux bras qui commençoient à pousser. Les uns étoient fort longs, & les autres fort courts : ces derniers se sont enfin allongés, & il n'a ensuite plus été possible de

les distinguer des autres.

UN Polype déretourné en partie, ne conserve pas long-tems la forme qu'il a d'abord après s'être mis dans cette situation * : il en prend ensuite plusieurs autres très-remarquables. C'est ce dont on pourra juger par les observations que je vais décrire.

J'AI retourné un Polype de la seconde espece, le 26. Septembre 1742. Ce Polype a entrepris de se déretourner. Il a réussi en partie *.

*Fig. 17.
& 18

*Pl. XI.
Fig. 17.

Le premier Octobre, la portion qui s'étoit déretournée *, savoir l'antérieure, étoit déjà attachée & réunie à celle sur laquelle elle s'étoit renversée, & formoit avec elle le boulet *a c*. Les bras étoient dirigés vers l'extrémité postérieure *. Il m'a paru qu'il n'y avoit en *c* aucune ouverture. Le boulet *a c*, composé

* *a c*.

* *b*.

comme je l'ai déjà dit , de la portion déretournée , & de la suivante sur laquelle la premiere s'est appliquée ; ce bourlet , dis-je , que je nommerai dans la suite simplement portion déretournée , avoit changé de situation d'une maniere remarquable , le 4. Octobre. Il n'étoit plus bout à bout avec le reste du corps du Polype , comme dans la Figure 17. L'endroit *a* , par lequel cette portion déretournée *ac* tenoit au reste *ab* du Polype , s'étoit un peu étranglé , & la portion *ac* faisoit avec lui un angle droit. C'est ce qui se voit dans la Figure 19. où *ac* représente la portion déretournée , & *ab* le reste du corps. Je remarquai le même jour en *c* , une tête de Polype ; & je ne pus comprendre comment elle s'étoit formée. Je soupçonnai que

c'étoit un jeune : mais la suite de mes observations m'en a fait douter. Cette tête est restée très-long-tems attachée au Polype, & beaucoup plus qu'elle n'auroit dû, si elle avoit été un jeune Polype ordinaire. Elle doit donc être considérée, ou comme un jeune Polype extraordinaire, ou comme une tête qui s'est formée en cet endroit, & qui dans la suite, en s'allongeant, a eu un col. Elle a pris différentes formes, que j'aurai soin de faire remarquer. Je l'appellerai dans la suite la portion équivoque. En observant avec attention, à la loupe, le Polype dont il s'agit dans cette expérience, je découvris, le 4. Octobre, en *a* * plusieurs bras qui * Pl. XI.
 commençoient à pousser, & qui me Fig. 19.
 parurent border un côté * d'une * a b.
 bouche † qui s'étoit formée en cet † a c n.

* *an.* endroit. L'autre côté * de cette bouche étoit bordé par une partie des
 * *ad, ad.* anciens bras * du Polype. J'observai
 le lendemain, 5. Octobre, ce Polype
 avec une grande attention, parce
 que j'étois extrêmement curieux de
 suivre la formation de la nouvelle
 bouche que j'avois remarquée le jour
 précédent. Je vis très-distinctement
 cette bouche. Les levres étoient dis-
 posées en mamelon conique, & les
 nouveaux bras étoient plus petits
 que les anciens. Je n'avois donc plus
 lieu de douter qu'il ne se fût formé
 une bouche à peu près sur le milieu
 de ce Polype, & par conséquent
 dans un tout autre endroit que celui
 où elle est ordinairement. Elle étoit
 outre cela remarquable, en ce qu'un
 côté de ses levres étoit garni, com-
 me je l'ai dit, de nouveaux bras, &

l'autre d'une partie des anciens. On verra bientôt ce qu'est devenu le reste des anciens bras. Le même jour, 5. Octobre, la portion déretournée ac^* , qui faisoit le 4. un angle droit* avec la portion non déretournée ab , s'étoit rapprochée de cette dernière partie, de manière qu'elle faisoit avec elle un angle aigu. C'est ce qu'on peut voir dans la Figure 20. où ac représente la portion déretournée, & ab , la portion non déretournée. La portion équivoque c paroissoit comme le 4. Je donnai un ver au Polype, pour juger s'il pouvoit déjà se servir de sa nouvelle bouche, & si ce qui entreroit par cette bouche, se répandroit dans les différentes portions qui composoient ce Polype extraordinaire. Le ver étant tombé sur les anciens bras, en fut d'abord ar-

* Fig. 19.
* cab .

rêté, & ramené sur la nouvelle bouche. Il fut avalé, comme il l'auroit été par un Polype ordinaire; & en moins d'une heure, je vis que les portions *ac*, *ab*, *ae** étoient renflées, qu'elles étoient toutes remplies de la matiere du ver, qui avoit déjà été macéré dans l'estomac.

* Pl. XI.
Fig. 20.

QUOIQUE depuis le 5. Octobre jusqu'au 9. j'aie régulièrement observé tous les jours le Polype dont il s'agit ici, je ne m'arrêterai pas à décrire ce que j'ai vu dans cet intervalle, parce que les différences que j'ai observées d'un jour à l'autre, ne sont pas assez remarquables. Mais il se trouva le 9. fort différent de ce qu'il étoit le 5. On peut en juger par la comparaison des Figures 20. & 21. Cette dernière représente au naturel ce Polype, tel qu'il étoit le 9. *ac*,

est la portion déretournée, & *ab*, la portion non déretournée : on voit distinctement que ces deux portions ont une bouche commune *. C'est ^{* Pl. XI.} cette bouche dont j'ai apperçu les ^{Fig. 21.} commencemens le 4 *, & qui est ^{* Fig. 19.} en partie garnie de nouveaux bras, ^{a & n.} & en partie d'anciens. Le reste des anciens bras se voit sur la portion déretournée *ac* *, depuis *a* jusqu'en *t*. ^{* Fig. 21.} La portion équivoque *e* étoit le 9. telle qu'elle est représentée dans cette Figure. Comme le Polype avoit mangé entre le 4. & le 9. il étoit crû sensiblement. Il a peu changé de figure entre le 9. & le 24. comme on le peut voir en comparant la Fig. 21. qui le représente tel qu'il étoit le 9. avec la Figure 22. qui le représente tel qu'il étoit le 24. Il étoit plus grand le 24. Les anciens bras, qui

*Pl. XI. étoient le 9. entre *a* & *t* *, étoient
 Fig. 21. disparus le 24. J'aperçus ce jour-là

*Fig. 22. une tête en *u* * qui avoit déjà un col ,
 & que je pris d'abord pour un jeune :
 mais elle est restée telle qu'elle étoit
 alors ; pendant plus de trois mois
 que j'ai observé ce Polype depuis ce
 tems-là ; ce qui donne lieu de pen-
 ser que ce n'étoit pas un jeune ; mais
 simplement une tête. Le Polype avoit
 le 24. deux petits , dont l'un sortoit
 de la portion déretournée en *g* ; &
 l'autre , de la portion non déretour-
 née en *f*. Ils se sont séparés quelques
 jours après.

DEPUIS le 9. Octobre , jusqu'à ce
 que j'aie cessé d'observer le Polype
 dont il s'agit ici , je l'ai vu marcher
 plusieurs fois. Il se fixoit ordinaire-
 ment par ses deux extrémités posté-

*Fig. 22. rieures *, On juge bien qu'en mar-
 b & c.

chant , il devoit prendre des attitudes fort différentes de celles qui sont représentées dans les Figures 21. & 22. Lorsqu'il étoit en repos , il étoit ordinairement dans la situation , ou dans une situation approchante de celle qui est représentée dans la Figure 22. c'est-à-dire , que les portions *ac* & *ab* étoient plus ou moins rapprochées l'une de l'autre. Je ne m'arrêterai point à ce que j'ai observé au sujet de ce Polype , jusqu'au 17. Décembre : il suffira que je le décrive tel qu'il étoit en ce jour-là. Il étoit fixé contre les parois du verre par les extrémités *b* & *c* * , de ma-
 *Fig. 23.
 niere que les portions *ab* & *ac* , étoient à peu près bout à bout l'une de l'autre. Il avoit quatre petits , dont un sortoit de la portion non déretournée * , & trois de la por-
 * *ab*.

* *a c.* tion déretournée *, sans compter un
 * Pl. XI. jeune en forme de cone *, qui sortoit
 Fig. 23. aussi de cette portion. La portion
 k. * *e.* équivoque * avoit aussi deux jeunes
 semblables.

J'AI nourri ce Polype jusqu'au
 mois de Février suivant, sans re-
 marquer en lui de changement con-
 sidérable. C'est dans ce mois-là que
 j'ai cessé de l'observer. Il y a tou-
 jours eu une communication entre la
 * Fig. 23. portion déretournée *a c* *, & la por-
 tion non déretournée *a b*; c'est-à-
 dire, que les alimens qui passaient
 par la bouche *a*, ou par la bouche *u*,
 se répandoient dans ces deux por-
 tions. Mais je n'ai plus remarqué de
 communication entre la portion
 équivoque *e*, & le reste du Polype,
 depuis la fin de Décembre.

LES observations que je viens de
 rapporter

DES POLYPES. IV. Mém. 251
rapporter, suffisent pour faire sentir
combien sont curieux les Polypes
qui se déretournent en partie. Pour
bien juger des révolutions qui se font
dans ces animaux, on n'a qu'à com-
parer de suite les Figures 17. 19. 20.
21. 22. & 23. qui représentent le
même Polype, & dans lesquelles la
portion déretournée est toujours
marquée *ac*, & celle qui n'est pas
déretournée *ab*.

Ces changemens ne sont pas les
mêmes dans tous les Polypes. Ils va-
rient au contraire considérablement.
J'ai observé plusieurs Polypes qui
s'étoient déretournés en partie, &
je n'en ai pas trouvé deux dont les
changemens de figure fussent parfai-
tement semblables.

LES observations suivantes, faites
sur un Polype déretourné en partie,

Tome II,

R

m'ont paru dignes d'être rapportées. Lorsque je pris ce Polype pour le retourner, il avoit deux petits qui fortoient à peu près du milieu de son corps, l'un d'un côté, & l'autre de l'autre. Leurs bras avoient commencé à pousser. Avant que de retourner la mere, je coupai le plus grand de ces deux jeunes Polypes, aussi près du corps de cette mere qu'il fut possible, de sorte qu'il y eût une ouverture dans sa peau à l'endroit où étoit le jeune. Celui qui étoit resté attaché à la mere, se trouva dans son estomac dès qu'elle fut retournée. Comme il étoit déjà assez avancé, je ne m'attendois pas à le voir se retourner de lui-même, ainsi que j'ai dit que le font ceux qui ne sont pas avancés *. Je comptois qu'il s'étendrait droit dans l'estomac, & que sa tête

fortiroit par la bouche de la mere retournée, comme il arrive souvent. Au lieu de cela, je le vis paroître sur le milieu de son corps, mais sur le côté opposé à celui auquel il étoit attaché, & où il auroit dû paroître s'il s'étoit retourné de lui-même. Je n'eus pas besoin d'en chercher longtemps la raison : je vis clairement que ce jeune Polype s'étant trouvé, après le retournement, enfermé dans l'estomac, étoit passé par l'ouverture faite à la peau de la mere en séparant l'autre jeune d'elle, & avoit paru en dehors de cette mere, précisément à l'endroit où étoit auparavant le jeune qui avoit été retranché. Ce fait excita extrêmement ma curiosité. On verra bientôt ce que devint ce jeune.

LA mere a été retournée le 24.

Rij

Septembre 1742. Elle s'est déretournée en partie ; & la portion déretournée , après s'être peu à peu inclinée sur la portion non déretournée , entre le 24. Septembre & le 4. Octobre , faisoit ce jour-là avec elle un angle droit. C'est ce qu'on peut voir dans la Figure 1. de la Planche XII. dans laquelle *ac* représente la portion déretournée ; *ab* , la portion non déretournée ; & *ei* , le jeu ne dont j'ai parlé ci-dessus. L'endroit *a* , par lequel la portion *ac* tenoit à la portion *ab* , avoit commencé à s'étrécir.

Le lendemain , 5. Octobre , mon Polype se trouva dans une situation bien différente de celle où il avoit été le jour précédent. Quiconque ne l'auroit pas observé auparavant avec une grande attention , & n'au-

Soit pas été fort accoutumé à un examen suivi de ces animaux , auroit eu bien de la peine à le reconnoître. La portion déretournée *ac**, s'étoit ^{*PL. XII.} placée ^{Fig. 1.} parallèlement à la portion non déretournée *ab* ; & le jeune Polype *ei* se trouvoit bout à bout de la portion non déretournée *ab*, & paroïssoit parfaitement uni avec elle. L'état dans lequel se trouva le Polype déretourné en partie , dont il s'agit ici , est représenté dans la Fig. 2. *ac*, représente la portion non déretournée , désignée par les mêmes lettres dans la Figure 1. *eb*, est la portion non déretournée ; & *ei*, le jeune qui est bout à bout avec cette portion *eb*. Après avoir examiné ce Polype , & admiré comment ce jeune s'étoit enté sur la portion non déretournée , je lui donnai à manger.

Les bras saisirent un ver , il l'avalâ par la bouche *i* , & les alimens se répandirent dans tout le corps *ieb* ; de sorte qu'après avoir vu cela , je n'eus plus lieu de douter que le jeune

- * Fig. 1. *ie* * ne fût parfaitement uni à la portion non déretournée *eb* , & ne formât avec elle un seul Polype , & un Polype certainement des plus singuliers , puisqu'il étoit composé d'un petit , & d'une portion de sa mere , sur laquelle il étoit enté. Ce n'est pas tout : la portion *eb** de la mere étoit retournée , & le petit *ie* ne l'étoit pas. Ainsi la moitié postérieure de ce Polype étoit retournée , & la moitié antérieure ne l'étoit pas. Mais il s'agissoit de savoir si ce jeune *ie* resteroit toujours uni à la portion *eb* de la mere , si le Polype *ieb* ne s'étrangleroit point en *e* , & si ensuite *ie* ne
- * Pl. XII.
Fig. 2.

DES POLYPES. IV. Mém. 257

se sépareroit point de eb . C'est à quoi j'ai donné une grande attention. Le 9. Octobre, le Polype étoit tel qu'il est représenté dans la Figure 3. Le jeune ie étoit toujours uni à la portion déretournée eb . Les anciens bras, qui ne bordoient pas la bouche a^* de la portion déretournée ac , * Fig. 3. se voyoient sur le corps de cette portion de a en o . Je donnai à manger au Polype ieb , & à la portion déretournée ac , & je remarquai qu'il n'y avoit plus de communication entr'eux. Le Polype ac s'est séparé du Polype ieb , le 15. Octobre. Je les ai nourris l'un & l'autre encore deux mois depuis leur séparation. Ils ont multiplié, & fait en tout les fonctions de Polypes complets. La partie antérieure ie du Polype ieb , résultante du jeune ie^* , ne s'est point * Fig. 1.

- * Fig. 3. séparée de la partie postérieure *eb* *
résultante de la portion non dére-
* Fig. 1. tournée *ab* * du Polype qui a été
retourné le 24. Septembre.

LE Polype dont je vais parler à
présent, a été retourné le 3. Octo-
bre 1742. Il étoit le lendemain dére-
* Pl. XI.
Fig. 18. tourné en partie *, J'ai vu clairement
le 10. qu'il s'étoit formé trois têtes
* 4. près de l'endroit * où les levres du
Polype s'étoient arrêtées après qu'il
a été déretourné en partie. Ces trois
têtes avoient déjà un col ce jour-là.
Le Polype paroissoit alors tel qu'il
est représenté dans la Figure 4. de la
Planche XII. *ab* désigne la portion
non déretournée, marquée aussi *ab*,
* Pl. XII.
Fig. 4. Fig. 18. Pl. XI. Le reste *adce* * est
venu de la portion déretournée. *d*,
g, *e*, sont les trois têtes qui se sont
formées en *a*, Fig. 18. Pl. XI.

J'AI donné plusieurs fois à manger à ce Polype , entre le 10. & le 24. Octobre , & il a pris des alimens par ses trois bouches *. Il a crû dans cet intervalle , & a changé de figure. ^{* Fig. 4. d, g, e.} On le trouve représenté dans la Figure 5. de la Planche XII. tel qu'il étoit le 24. & si on la compare avec la Figure 4. on pourra facilement juger du changement qui s'est fait. Les différentes parties du Polype , sont désignées dans l'une & dans l'autre par les mêmes lettres. *ab* , portion retournée. *ad c g e* , portion déretournée avec les têtes *d, g, e* , qui sont dans la Figure 5. désignées avec leurs cols par les lettres *ad, ng, ne*. *c* marque le bout antérieur du Polype , après qu'il a été déretourné. Il est désigné par la même lettre dans la Fig. 4. & dans la Fig. 18. de la Pl. XI.

* Fig. 5. LA portion co * s'est ensuite fendue de c en o , de sorte que le 6. Novembre la partie du Polype marquée $bacd$, ne tenoit plus à l'autre marquée $cngco$, que par un appendice qui étoit en o . C'est ce qu'on peut voir dans la Figure 6. qui représente ce Polype tel que je l'ai vu le 6. Décembre. o , appendice par lequel les deux parties $bacd$ & $cngco$, tenoient encore ensemble. ab , portion non déretournée. ac , partie de la portion non déretournée, marquée aoc dans la Figure 5. ad , une des têtes du Polype avec son col. Cette tête n'étoit pas ce jour-là dans la situation où elle étoit le 24. Octobre. Au lieu de faire avec ab l'angle

*PLXII. dab *, elle faisoit avec ab à peu

Fig. 5.

* Fig. 6. près une ligne droite dab *. La por-

* Fig. 5. tion oc désigne l'autre partie de aoc *

DES POLYPPES. IV. Mém. 261

qui s'est partagée , comme je l'ai dit de *c en o*. Ces deux parties *ac* & *oc**, * Fig. 6. qui en sont venues, ont crû , de même que le reste du Polype , entre le 24. Octobre & le 6. Novembre , par le moyen des alimens qu'il a pris. *ng, ne*, les deux autres têtes de ce Polype.

Les deux parties *badc* & *cng eo*, se sont séparées le 10. Novembre , & étoient ensuite telles qu'elles sont représentées dans les Figures 7. & 8. de la Planche XII. *ad** ne faisoit * Fig. 7. plus une ligne droite avec *ab*, comme le 6. Novembre, mais un angle *bad*, comme le 24. Octobre, ainsi qu'on en peut juger en comparant *bacd*, Fig. 7. avec *bacd*, Fig. 5. Pour la partie *cng e**, elle étoit le * Fig. 8. 10. Novembre à peu près comme le 6. de ce mois-là, & même comme

le 24. Octobre. C'est aussi ce dont on peut juger , en comparant ensemble les Figures 5. 6. & 8. J'ai gardé encore pendant quelque tems après le 10. Novembre , les deux parties représentées dans les Figures 7. & 8. Elles n'ont pas beaucoup changé de forme.

EN observant des Polypes déretournés en partie , j'ai souvent été curieux de savoir ce que devenoit la portion retournée du Polype , qui étoit couverte par la portion déretournée. Il me vint dans l'esprit que les parois de ces deux portions qui étoient appliquées l'une contre l'autre , se joignoient peut-être ensemble , enforte qu'elles ne formoient ensuite qu'une seule peau. Suivant cela , la portion déretournée * , de-

* Pl. XI.
Fig. 17.
& 18. a.
6.

voit , en quelque manière être dou-

blée par la portion retournée qu'elle avoit recouverte. Je pensai à cette occasion que si la portion déretournée est doublée par la portion retournée qu'elle a recouverte, on pourroit peut-être doubler un Polype, en introduisant dans son corps un autre Polype. Il s'agissoit donc de mettre dans l'estomac d'un Polype, un autre Polype, de maniere que les parois de l'estomac du premier fussent appliquées contre la superficie extérieure de la peau du second; & il s'agissoit d'observer ensuite si les peaux de ces deux Polypes se colle-roient ensemble, si le Polype intérieur serviroit de doublure au Polype extérieur, & si après cela ils ne formeroient plus qu'un seul Polype.

JE m'appliquai d'abord à chercher un expédient pour introduire un Po-

lype dans un autre Polype. Voici celui qui m'a paru le plus propre. Je donne d'abord à manger aux Polypes qui doivent servir pour cette expérience, afin que les alimens qu'ils prennent les obligent à se renfler, & servent à leur faire ouvrir la bouche quand cela sera nécessaire. Je mets ensuite sur ma main gauche, hors de l'eau, le Polype qui doit être introduit dans l'estomac d'un autre Polype: je le fais contracter le plus qu'il est possible; & je le presse avec un pinceau, de manière que les alimens qu'il a dans l'estomac, sortent en partie par la bouche, & la forcent à s'ouvrir. Ensuite je prens de la main droite une soie de sanglier, dont je fais entrer le plus gros bout dans la bouche du Polype, & que je pousse jusqu'au fond de son estomac. Il est

même assez facile d'introduire le bout d'une soie de sanglier dans le corps d'un Polype qui n'est pas rempli d'alimens. Quand cela est fait, je place sur ma main le Polype dans lequel le premier doit être mis, je lui fais ouvrir la bouche, & enfin je fais entrer dans son estomac ce Polype, & la soie de sanglier au bout de laquelle il est. Ce bout se trouve alors couvert par deux Polypes mis l'un dans l'autre. Je le trempe dans l'eau d'un petit verre préparé d'avance, je fais tomber les Polypes au fond; & je les examine avec une loupe.

JE n'ai d'abord pris aucune précaution pour obliger le Polype intérieur à rester dans le Polype extérieur: mais ayant remarqué qu'il en sortoit, j'ai eu soin dans la suite d'embrocher les deux Polypes après

qu'ils ont été mis l'un dans l'autre , de maniere que la soie de sanglier les transperçoit tous deux.

JE m'attendois de voir deux Poly-
pes mis l'un dans l'autre se coller en-
semble , & ne former ensuite qu'un
seul Polype : mais j'ai vu d'abord tout
autre chose , & une chose que j'au-
rois à peine crue possible. Les Poly-
pes mis l'un dans l'autre , quoiqu'em-
brochés comme je l'ai dit , se sont
séparés plusieurs fois : l'intérieur est
forti de l'extérieur. Les expériences
que je vais rapporter , feront con-
noître la maniere singuliere dont cela
s'est fait.

LE 17. Octobre 1742. j'ai mis un
Polype de la seconde espece dans un
autre Polype de cette espece. J'ai
auparavant retranché un peu le Poly-
pe extérieur par son bout postérieur ,
afin

afin qu'étant ouvert à cet endroit, & plus court que le Polype intérieur, le bout postérieur de ce dernier pût sortir par l'ouverture, & que je pusse m'assurer par-là que son corps alloit d'un bout à l'autre de l'estomac du Polype extérieur. Ensuite j'ai transpercé ces deux Polyptes avec une soie de sanglier. Je les ai mis dans un verre. Ils étoient tels qu'ils sont représentés dans la Figure 9. de la Planchette XII. dans laquelle *c* représente la tête du Polype intérieur, & *a* celle du Polype extérieur. *d*, le bout postérieur du Polype intérieur, & *b*, celui du Polype extérieur. On voit par cette Figure, que la tête & la queue du Polype intérieur, sortent de l'extérieur. Le 17. Octobre même, le bout postérieur *b d** du Polype intérieur *c a b d*, a fendu la peau du Po-

*Pl. XII.
Fig. 9.

lype extérieur, & est passé par cette ouverture, de sorte que le soir il étoit déjà parvenu à l'endroit marqué *i* dans la Figure 10. La portion *id* du Polype intérieur, étoit donc déjà sortie du Polype extérieur. L'ouverture faite à la portion *ib* du Polype extérieur, s'est toujours refermée à mesure que la portion *id* avançoit. Je n'ai jamais apperçu cette ouverture, ni même de cicatrice.

LE 18. Octobre au matin, je trouvai que le bout postérieur du Polype intérieur, avoit continué à sortir du Polype extérieur, en le fendant par le côté; & qu'il étoit déjà dehors jusqu'à l'endroit *e* *, où la soie de sanglier transperçoit les deux Poly-
 *Fig. 11. pes. Je trouvai le soir que le Polype intérieur sortoit du Polype extérieur un peu au-dessus de *e*. On voyoit dis-

inctement que la soie de sanglier transperçoit ces deux Polypes l'un après l'autre. C'est ce qui est représenté dans la Figure 11. où *c a i d* représente le Polype intérieur, & *a i b*, le Polype extérieur. *i d* est la portion du Polype intérieur qui est sortie de la portion *i b* du Polype extérieur, en l'ouvrant peu à peu.

LE 21. le bout antérieur *c a* * du ^{*Pl. XII. Fig. 114} Polype intérieur, a commencé à fendre les levres du Polype extérieur; & le lendemain la portion *c a i* du Polype intérieur, étoit entièrement sortie de la portion *a i* du Polype extérieur, en sorte que ces deux Polypes étoient alors à côté l'un de l'autre *. Ainsi le Polype *c e d*, qui ^{*Fig. 114} avoit été mis dans le Polype *a e b* le 17. Octobre, en est sorti en quatre jours, en le fendant peu à peu de *b* en *e*, & de *a* en *c*.
Sij

J'AI vu manger un vër à chacun de ces deux Polypes le 25. Octobre ; & le jour suivant je les ai defembrochés.

*Fig. 12. Ils étoient un peu attachés en *e* ; mais quelques jours après ils se sont entierement séparés. Je les ai nourris pendant quelque tems , & ils n'ont en rien différé des autres Polypes.

LES deux Polypes dont je vais parler , ont aussi été mis l'un dans l'autre , & l'intérieur est aussi sorti de l'extérieur , mais un peu différemment de celui dont il a été question ci-dessus. C'est le 17. Octobre 1742. que j'ai mis l'un dans l'autre les Polypes dont il s'agit ici. Je les ai embrochés , mais un peu plus près de la tête que les deux précédens. Le bout

*Fig. 13. postérieur *b d* * du Polype intérieur , sortoit par l'extrémité postérieure *b* de l'intérieur ; mais la tête de l'inté-

rieur paroissoit à peine hors de la bouche de l'extérieur le jour de l'opération. Le lendemain, 18. Octobre, je n'ai pu appercevoir que les bras * de l'intérieur, & ensuite ils ^{* Pl. XII.} sont même rentrés entièrement dans ^{Fig. 13.} le corps de l'extérieur. Le 19. j'ai trouvé le matin les bras * du Polype ^{* a.} intérieur qui sortoient de la bouche du Polype extérieur, laquelle étoit formée en mamelon conique *. Vers ^{* a.} le midi, j'ai vu la tête même du Polype intérieur hors de la bouche de l'extérieur. A quatre heures, je n'ai plus vu que les bras, de même que toute la soirée, pendant laquelle j'ai observé plusieurs fois ces Polypes. J'ai compté à neuf heures & demie du soir cinq bras * de l'intérieur, qui ^{* a.} sortoient par la bouche *a* de l'extérieur. Le 20. à huit heures & demie

du matin , quelques bras de l'intérieur sortoient par la bouche de l'extérieur. Toute la tête sortoit à deux heures après midi ; & depuis ce moment-là jusqu'à neuf heures & demie du soir , j'ai toujours vu la même chose. Je n'ai apperçu le 21. que quelques bras du Polype intérieur qui sortoient de la bouche du Polype extérieur. A midi , j'ai trouvé un grand changement. La queue du Polype intérieur avoit fendu en partie un côté du Polype extérieur , & en

Fig. 14. étoit sortie. Le soir , la portion *e d* * du Polype intérieur , qui sortoit de l'extérieur *a e b* , aboutissoit déjà à l'endroit *e* , où la soie de sanglier *nf* transperçoit les deux Polypes. La tête & les bras du Polype intérieur , ne paroissent plus hors de la bouche * de l'extérieur , mais cinq bras

to, to, &c. sortoient par une ouverture *t*, par laquelle passoit la soie de sanglier. Cette ouverture étoit au côté opposé à celui par lequel sortoit la portion *e d* de l'intérieur. Le 22. je n'ai vu que deux bras *to, to* * hors ^{*Pl. XII.} de l'ouverture *t*, par laquelle il en ^{Fig. 15.} sortoit cinq le jour précédent : mais il en sortoit un * par une ouverture * ^{* c c.} qui étoit au côté opposé. Il m'a ^{* c c.} semblé que je voyois même la tête du Polype intérieur qui se monroit un peu par cette dernière ouverture. Enfin, cette tête est sortie le 23. par l'ouverture *e*, & le Polype intérieur s'est trouvé hors du Polype extérieur, & placé à côté de lui *.

*Fig. 12.

ON voit donc que le Polype intérieur, au lieu de fendre la portion *a e* du Polype extérieur, pour faire sortir son bout antérieur, comme cela

est arrivé dans le cas décrit ci-dessus ; on voit, dis-je, que le Polype intérieur a retiré sa tête en dedans de l'extérieur, & l'a ensuite fait sortir par le côté de ce Polype, & avec *Fig. 12. elle toute la partie antérieure *ce* *.

Je dois faire remarquer ici que le Polype intérieur a été pendant quatre jours dans le Polype extérieur ; & qu'au bout de ce tems-là il en est sorti en vie, & se portant bien. C'est de ce fait dont j'ai voulu parler dans le second Mémoire *.

* Tome I.
pag. 238.
239.

ON pourroit peut-être dire que le Polype intérieur n'a pas été digéré par le Polype extérieur, parce que ce dernier étant transpercé par une soie de sanglier, ne peut pas digérer comme un Polype qui n'est pas transpercé. Mais pour répondre à cette objection, je dirai que le Polype

extérieur dont il s'agit , & qui n'a pu en quatre jours faire mourir dans son estomac le Polype intérieur , a mangé , pendant qu'il étoit embroché , plusieurs vers , qui sont morts , & qui ont été digérés en peu de tems dans son estomac.

LES deux Polypes dont je vais parler à présent , ont été mis l'un dans l'autre le 9. Octobre 1742. Ils étoient ce jour-là tels que ceux qui sont représentés dans la Figure 9. de la Planche XII. Le succès de l'expérience que j'ai faite sur eux , a été fort différent de celui des deux expériences que je viens de rapporter. Ces deux Polypes n'avoient point changé de situation le 12. lorsque je retirai la soie de sanglier qui les transperçoit : mais je remarquai le soir que le bout *c a ** du Polype intérieur

* Pl.
XIII.
Fig. 1.

qui sortoit de la bouche *a* du Polype extérieur, étoit beaucoup plus long que les jours précédens. Je ne fais si cela venoit de ce que le bout *c a* étoit davantage étendu, ou si réellement le Polype intérieur sortoit davantage de la bouche du Polype extérieur. Le 13. la queue du Polype intérieur a fendu de bas en haut le corps du Polype extérieur jusqu'à l'endroit marqué *i* *. La portion *i d* désigne celle du Polype intérieur qui est sortie de l'extérieur. Ils étoient encore le 16. tels qu'ils sont représentés dans la Figure 2. J'ai donné un ver au Polype intérieur *c a i d*, qui

* *a.* pouvoit seul manger, la bouche * de l'autre étant remplie par la portion de ce Polype qui en sortoit. Cependant j'ai remarqué que les alimens se sont non seulement répandus dans le Poly-

* Fig. 2.

pe intérieur qui avoit mangé, mais aussi dans le Polype extérieur. C'est ce dont il étoit facile de juger par le renflement du bout postérieur *ib* * * Fig. 2. du Polype extérieur *aib*. En effet, si les alimens s'étoient seulement répandus dans le Polype intérieur *caid*, il n'y auroit eu de renflé que les portions *ca*, *ai*, & *id*; & *ai*, entant que portion du Polype extérieur *aib*, n'auroit même paru enflée, que parce qu'elle contenoit la portion *ai* du Polype intérieur qui étoit cachée sous celle-là. On voit dans la Figure 3. les Polypes tels qu'ils étoient quelque tems après que le Polype intérieur eut mangé; & l'on peut facilement remarquer que la portion *ib*, qui est le bout postérieur du Polype extérieur, est renflée, & remplie d'alimens,

POUR que les alimens aient passé du Polype intérieur dans le Polype extérieur, il a fallu que la portion

* PL*a*i * du Polype intérieur se soit ouverte.
 XII.
 Fig. 2. & verte quelque part.

^{3.}
 * Fig. 2. LE bout antérieur * du Polype intérieur a changé de place d'une manière très-sensible le 19. il ne sortoit

^{4.}
 * 4. plus ce jour-là de la bouche * du Polype extérieur comme les jours précédens ; mais après avoir fendu les levres de ce Polype , il s'est trouvé sortir de son corps un peu au-dessous de la tête : c'est ce qui est représenté dans la Figure 4. où les lettres *co* désignent le bout antérieur du Polype intérieur marqué *ca* dans

* Fig. 4. la Figure 2. La bouche * du Polype extérieur s'étant trouvée dégagée , j'ai essayé de lui donner un Ver ; il l'a avalé , & après qu'il a été digéré ,

le suc nourricier s'est répandu sensiblement dans toutes les parties des deux Polyppes.* J'ai vu la même chose ^{* Fig. 5.}
 le 22. après avoir fait avaler un Ver ^{*ai, co,*}
 à la portion *co*. Les alimens ont aussi ^{*ib, & id.*}
 passé de cette portion dans les autres : il n'y avoit donc aucun lieu de douter que le Polyppes intérieur dont les portions *co* & *id* * faisoient partie, ne communiquât avec le Poly- ^{* Pl. XIII.}
 pe extérieur *ai b* ; c'est-à-dire , que ^{Fig. 4.}
 le Polyppes intérieur s'étoit ouvert entre *i* & *o*. Il me seroit impossible de dire dans quel état étoit la portion du Polyppes intérieur cachée dans le Polyppes extérieur peu après qu'elle s'est ouverte : mais je puis assurer qu'elle s'est ensuite confondue avec la portion *ai* * du Polyppes extérieur, ^{* Fig. 4.}
 sans oser cependant dire comment cela s'est fait. J'ai observé cette por-

tion *ai* pendant environ trois mois ; & de bien des manieres ; & elle m'a toujours paru telle qu'est une portion d'un Polype ordinaire. Les portions *co* & *id* du Polype intérieur étoient comme entées sur le Polype extérieur *aib* ; elles communiquoient avec lui comme un jeune Polype communique avec sa mere. Ces deux Polypes réunis ont crû & multiplié ; on en peut juger par la Figure 6. qui les représente tels qu'ils étoient le 6. Novembre : ils produisoient

* Fig. 6.
 63 63 63 63

alors quatre jeunes * , & il s'en étoit déjà séparé quelques-uns. La portion antérieure *co* du Polype intérieur paroissoit plus éloignée de la tête du Polype extérieur qu'elle n'étoit le 19.

* Fig. 4.

Octobre *. J'ai tout lieu de croire que cela ne vient pas d'un changement de place , mais de ce que la

portion *ao* * du Polype extérieur * Fig. 6.
 s'est allongée. La portion *co* a communiqué avec la portion *ai* jusqu'au 20. Novembre. Les alimens passaient sensiblement de l'une dans l'autre : cette portion *co* s'est ensuite étreécie en *n* *, & c'est par-là qu'elle s'est séparée du reste le 24. Décembre; après quoi elle a fait un Polype à part *, * Fig. 9. de même que l'autre partie des deux Polypes *. Le bout postérieur *id* du Polype intérieur étoit parfaitement réuni avec le Polype extérieur *aib*, & il l'étoit encore autant que jamais à la fin de Février 1743. lorsque j'ai cru pouvoir cesser de l'observer.

ON peut juger par la dernière Expérience que je viens de rapporter, qu'un Polype peut, en quelque manière, être enté sur un autre Polype : on a vu du moins que les portions

* Pl.
XIII.
Fig. 9.

* Fig. 6. c o & id * du Polype intérieur ont été long-tems unies avec le Polype extérieur *aib* comme une branche ou une greffe est unie au tronc auquel elle est attachée.

MAIS ce n'est pas cela seulement que j'ai cherché lorsque j'ai commencé à mettre des Polypes les uns dans les autres. J'ai voulu voir si le Polype intérieur ne s'incorporeroit point avec le Polype extérieur sans en sortir, de maniere qu'on pût dire qu'il l'a doublé, & que de deux Polypes il s'en est formé un.

DE toutes les Expériences que j'ai faites dans ce but-là, il n'y en a point qui ait mieux répondu à mon attente que celle que j'ai commencée le 22. Octobre 1742. Le Polype que j'ai mis ce jour-là dans un autre Polype n'en est jamais sorti ni en tout ni en
partie :

partie : je l'avois retourné avant que de le faire entrer dans l'autre Polype ; & j'ai eu soin , comme à l'ordinaire , d'embrocher les deux Polypes après qu'ils ont été mis l'un dans l'autre. Je ne faurois dire ce qu'est devenu le corps du Polype intérieur , s'il a été dissous dans l'estomac du Polype extérieur , ou s'il s'est incorporé avec ce dernier Polype : mais je puis assurer que j'ai vu ce corps de Polype intérieur dans le Polype extérieur plusieurs jours après qu'il y a été introduit. Par rapport à la tête du Polype intérieur , je suis assuré qu'elle s'est réunie avec celle du Polype extérieur. Les levres de ce dernier Polype se sont collées contre le col du premier ; & au bout de quelque tems les deux têtes de ces Polypes n'en formoient qu'une qui avoit deux

* Pl. rangs de bras * : j'ai vu très-distinctement à diverses fois que j'ai donné à manger au Polype *c a b* *, qu'il n'avoit qu'une bouche , & que c'étoit celle du Polype intérieur. La bouche de l'extérieur * étoit remplie par la tête du Polype intérieur , ou plutôt , elle n'étoit plus une bouche : on ne distinguoit plus que les bras qui avoient bordé ses levres , & qui formoient alors le second rang de bras * dont je viens de parler.

J'AI nourri ce Polype depuis le 22. Octobre 1742. jusqu'au milieu de Février 1743. qu'il est mort de maladie : il a crû & multiplié pendant cet intervalle de tems , & j'ai toujours pu distinguer les deux rangs de bras qu'il avoit à sa tête.

* Fig. CE Polype * n'est pas un des moins
20. extraordinaires dont nous ayons par-

le jusqu'à présent : il étoit composé du Polype extérieur & du Polype intérieur, ou du moins de son bout antérieur qui auroit pu facilement devenir un Polype parfait. On peut donc assurer qu'il étoit composé de deux Polypes ; & cela étant, on peut regarder l'Expérience dont il s'agit ici comme l'opposé de la première que nous avons faite sur les Polypes. Celle-ci nous a appris que d'un Polype on pouvoit en faire deux ; & celle-là, que de deux Polypes on pouvoit en faire un.

Le hasard m'a appris à réunir des portions de Polypes : j'avois mis dans un petit verre deux morceaux de Polypes dont je m'étois servi pour faire une Expérience. Les ayant examinés le lendemain, je remarquai qu'ils étoient attachés l'un à l'autre : je les

coupai de nouveau , & je les rapprochai exprès ; ils se réunirent encore : il n'en fallut pas davantage pour me porter à faire cette Expérience avec attention. Voici comment je m'y prens pour réunir des portions de Polypes.

A P R È S avoir coupé le Polype dont je veux réunir les moitiés , je mets ces moitiés au fond d'un verre plat dans lequel il n'y a de l'eau qu'à la hauteur de quelques lignes : je les rapproche l'une de l'autre en les poussant avec la pointe d'un pinceau , & je les dispose de manière que les deux bouts par lesquels elles doivent se réunir se touchent , ou peu s'en faut. S'ils se touchent , j'observe à la loupe s'ils continuent à se toucher : s'ils ne se touchent pas tout-à-fait , j'examine si les moitiés en s'é-

tendant ne rapprochent pas ces deux bouts l'un de l'autre jusqu'à se rencontrer. Il arrive souvent que les portions de Polype se dérangent , & que les extrémités qui doivent se toucher s'éloignent l'une de l'autre. Alors je les remets avec un pinceau dans la situation où elles doivent être: mais si je vois que leurs bouts continuent à se toucher , j'ai grand soin de les laisser dans un parfait repos. C'est après que les bouts se sont touchés pendant quelque tems , un quart d'heure , une demi-heure , une heure , que l'on commence à s'appercevoir qu'ils s'attachent : mais cela n'arrive pas à tous ceux qui se sont touchés pendant quelque tems. On trouve souvent ensuite qu'ils se sont éloignés l'un de l'autre , soit par la contraction , soit par le dérangement de

la situation des portions de Polypes. Il faut dans ce cas remettre ces portions dans la situation convenable. Il m'a paru qu'il étoit bon de les forcer à se contracter avant que de les rapprocher. On oblige par-là les bouts qui doivent se toucher à s'élargir ; & plus ils sont larges plus il est apparent qu'ils se réuniront : c'est au moins ce que j'ai lieu de conjecturer. Quoique j'aie soin de rapprocher les portions de Polypes d'abord après qu'elles ont été séparées , ce n'est pas que cela soit absolument nécessaire pour que l'Expérience réussisse : j'en ai vu qui n'ont commencé à se réunir que deux heures après que le Polype avoit été coupé. Peut-être que si l'on s'obstinoit à rapprocher toujours les bouts de portions de Polypes qui s'éloignent , on parvien-

droit enfin à les faire toutes réunir.

JE n'ai poussé à cet égard la patience que jusqu'à un certain degré : je n'ai rapproché les portions de Polypes , à mesure qu'elles se dérangeoient , que pendant une heure ou deux. En général le succès n'est pas si fréquent dans cette Expérience que dans celles dont j'ai parlé jusqu'à présent.

LES deux portions de Polypes ne sont d'abord réunies que par une partie de leur extrémité : le Polype qu'elles forment est fort étranglé à l'endroit où la réunion s'est faite * : mais à mesure qu'on le nourrit , l'étranglement diminue & disparoit enfin entièrement.

JE ferai mention à présent en particulier de quelques Polypes dont j'ai fait réunir les portions , afin que

T iiij.

* Pl.
XIII.
Fig. 124.

par le moyen de ces exemples , on puisse se faire une idée plus nette de la chose.

J'AI coupé transversalement le 5. Novembre 1742. à deux heures après midi , un Polype de la seconde espe-

* Pl. XIII. Fig. 12. *
 ce : j'ai rapproché les deux moitiés *
 de maniere que le bout antérieur de
 la seconde touchoit le bout posté-
 rieur de la premiere : il m'a paru peu
 après qu'elles commençoient à se
 réunir ; j'ai vu distinctement le soir
 qu'elles étoient attachées l'une à l'autre : mais , comme je l'ai dit ci-dessus , le Polype qu'elles formoient étoit fort étranglé à l'endroit où la réunion s'étoit faite * : j'ai donné un Ver à ce Polype le lendemain. Mon but étoit non-seulement de voir s'il mangeroit , mais sur-tout s'il y avoit une communication entre la premiè-

re & la seconde partie : c'est ce dont j'ai eu une démonstration ; car j'ai vu passer une partie du Ver de la moitié antérieure * qui l'avoit avalé , * *ac*
 dans la moitié postérieure * qui lui * *c b*
 étoit réunie. Ces deux parties ont été ensuite renflées * ; & l'endroit par le- * *Fig. 138*
 quel elles étoient réunies paroissoit * *ac & cb*
 encore fort étranglé *. Le 15. le Po- * *c*
 lype a commencé à pousser un jeune ,
 & ensuite il en a poussé plusieurs autres : l'étranglement n'étoit plus sensible le 20.

APRÈS être parvenu à réunir des portions d'un même Polype , j'ai entrepris de réunir celles de différens Polypes. J'ai coupé le 7. Novembre 1742, deux Polypes de la seconde espece , & rapproché la premiere partie de l'un de la seconde partie de l'autre & réciproquement : l'Expé-

rience n'a réussi que sur deux de ces parties ; c'est-à-dire , qu'une première moitié d'un Polype s'est attachée à une seconde moitié d'un autre Polype. Il y avoit ceci de remarquable que la première partie étoit blanchâtre , & la seconde d'un brun assez foncé. J'ai donné le 7. Novembre même , à onze heures du soir , un Ver à ce Polype ; & le lendemain à huit heures du matin , j'ai trouvé que ce Ver étoit entièrement passé dans la seconde partie ; elle étoit fort renflée , & la première ne l'étoit point : j'ai donné à manger à cette première partie. L'endroit par lequel les deux moitiés réunies se touchoient , n'a commencé à s'élargir que le 13. & vers la fin du mois , après que le Polype a eu fait quelques repas , l'étranglement ne se remarquoit plus , & les

deux moitiés avoient une même couleur ; elles étoient brunes. Ce Polype composé des portions de deux différens Polypes a ensuite multiplié au-dessus & au-dessous de l'endroit où les portions se sont réunies ; c'est-à-dire , que chaque portion a produit des petits : je l'ai observé jusqu'à la fin du mois de Fevrier suivant.

J'AI aussi essayé de faire tenir ensemble des portions de Polypes de différente espece : je ne puis pas dire que j'aie réussi ; j'ai seulement vu deux morceaux de Polypes , l'un de la seconde & l'autre de la troisieme espece , qui ont été un peu attachés ensemble pendant une quinzaine de jours , & qui ensuite se sont séparés ; mais je n'ai pas tenté cette Expérience assez souvent ni avec assez de soin pour assurer qu'elle ne peut pas réussir.

LORSQUE je fus parvenu à réunir des portions de Polypes , à les greffer en quelque maniere , je fis d'abord part , suivant ma coutume , du succès de cette Expérience à M. de Reaumur. Ce fait ne lui étoit pas nouveau : c'est ce qu'il a eu la bonté de m'apprendre par une Lettre datée le 14. Décembre 1742. « Ayant » jetté , dit-il , des Polypes coupés en » deux les uns sur les autres dans un » verre extremement conique , deux » morceaux se réunirent : c'est même » ce qui me donna l'idée de faire plus » en grand ce que vous avez exécuté » en petit. Je songeai à réunir deux » moitiés de deux différentes Orties » coupées par un plan perpendiculaire à la base. M. de Villars , Médecin à la Rochelle , voulut bien se charger de faire ces opérations : il a

» été obligé d'avoir recours à la su-
 » ture pour assujettir les deux moitiés
 » l'une contre l'autre. Quelques-unes
 » de ces Expériences lui ont réussi ;
 » mais il y en a beaucoup plus qui
 » lui ont manqué : il les continue ac-
 » tuellement ».

CET extrait de Lettre de M. de Reaumur confirme, comme on le voit, ce que j'ai dit sur la réunion des portions de Polypes : mais il nous apprend encore que cette Expérience a aussi réussi sur des animaux fort différens.

LA ressemblance qui se trouve à cet égard entre les Orties de mer & les Polypes d'eau douce à bras en forme de cornes, peut encore servir à nous prouver que les propriétés singulieres que nous avons remarquées à ces derniers animaux se trouvent

aussi dans d'autres. C'est ce que j'ai déjà fait voir par rapport à la manière de multiplier des Polypes par rejettons & par bouture *. J'aurois pu encore dans la suite de ces Mémoires à l'occasion de différens faits que leur Histoire nous présente , parler de quelques autres rapports qu'ils ont avec d'autres animaux : mais je n'ai pas voulu trop interrompre le narré de mes Expériences , & j'ai préféré de renvoyer ici ce qui me paroît nécessaire de dire sur ce sujet.

* Tomell.
pag. 124.
& suiv.

LES Insectes dont je viens de donner l'Histoire , doivent le nom de Polype , comme on l'a vu ci-dessus *, au rapport qu'a leur forme avec celle des Polypes de mer.

* Tom. I.
pag. 102.
& suiv.

IL est bien naturel de demander si ces animaux n'ont point entr'eux d'autres ressemblances , & sur-tout

si les Polypes marins n'ont point les propriétés singulieres qui sont actuellement connues dans les Polypes d'eau douce à bras en forme de cornes ? Je tâcherai de répondre , autant qu'il me sera possible , à ces questions , en rapportant une partie de ce qu'on trouve dans les Auteurs sur les Polypes de mer.

Ces Polypes sont de grands animaux , en comparaison de ceux dont il a été question dans ces Mémoires. Il paroît par ce qu'on en dit , qu'ils ont communément entre un & trois piés de longueur. Pline parle * d'un monstrueux Polype , dont les bras avoient, dit-il, trente piés de long, & qui étoient si épais , qu'un homme pouvoit à peine les embrasser. Je crois qu'il est permis de douter d'un pareil fait.

* Hist.
Nat. lib.
9. cap.
30.

LES Polypes de mer sont voraces , & se servent de leurs bras comme ceux d'eau douce , pour saisir leur proie , & pour la porter à la bouche.

Nous n'avons , à ce que je crois , rien de si détaillé , ni de si exact , sur l'anatomie de ces animaux , que ce qui se trouve dans les Oeuvres de Swammerdam *. Cet habile Naturaliste a anatomisé la Seche , qui est une espece de Polype. On peut voir dans sa Description , que l'intérieur de cet animal n'a pas une structure si simple , que nous paroît être celle des Polypes d'eau douce à bras en forme de cornes.

Tous les Naturalistes disent unanimement , que les Polypes de mer sont mâles & femelles , s'accouplent , & sont ovipares *. J'ai vu les œufs de la Seche , ils sont noirs , & ils sont
attachés

* Biblia
Nat. pag
176. &c.

* Voi.
sur tout.
Arist.

attachés plusieurs ensemble en forme de grappe de raisins. J'ignore si les Polypes de mer ont d'autres manieres naturelles de multiplier que celle-ci.

CE qui intéresse le plus ici, c'est de savoir si l'on ne peut point les multiplier en les coupant. Aldrovan-
de dit * ; que le Polype coupé par morceaux , vit ; & je ne sache pas qu'il y ait rien de plus dans d'autres Auteurs. Il est bien apparent que cela signifie seulement que les morceaux d'un Polype donnent encore des marques de vie ; mais non que ce qui manque à chacun d'eux pour être un animal complet , se reproduit au bout de quelque tems. On ne pourra donc savoir s'ils ont cette propriété , que lorsqu'on aura coupé ces Polypes , & observé de suite les portions qui auront été séparées.

Hist.
Animal.
lib. 5.
cap. 18.
Maffa-
rius In
nonum.
Plin. lib.
pag. 182.
& seq.
Basileæ
1537.

* Proleg.
in lib. de
Inf. pag.
17.

IL est cependant parlé de la reproduction de quelques parties des Polypes de mer, qui a certainement lieu dans ceux d'eau douce à bras en forme de cornes. C'est celle des bras qu'ils ont perdus en tout ou en

* *Ælian.*
Hist. lib.
3. cap.
17.

partie. Elie dit * que les Polypes de mer mangent leurs propres bras lorsqu'ils manquent d'alimens. D'autres

* *Arist.*
Hist.
Animal.
lib. 8.
cap. 2.
Plin.
Hist.
Nat. lib.
9. cap.
29.

Auteurs le nient, & assurent que ce sont les congres qui les rongent ; mais tous conviennent que ces bras recroissent.

JE cite ces différens Auteurs ; mais sans vouloir décider du degré de foi que méritent les faits qu'ils avancent : il faudroit, pour le pouvoir, connoître les observations sur lesquelles est fondé ce qu'ils disent, & savoir comment elles ont été faites. Ce sont des détails qui ne se trouvent

dans aucun de ces Auteurs.

J'AI indiqué dans le troisieme Mémoire *, les rapports connus entre * Tom. II. pag. 126. les Polypes à bras en forme de cornes, & ceux à panache. Il n'est pas nécessaire que je m'y arrête à présent.

IL y a plusieurs especes d'autres animaux, beaucoup plus petits que les Polypes à panache, & qui paroissent devoir être aussi rangés dans la classe des Polypes. M. de Reaumur en a trouvé en grande quantité aux environs de Paris, & en Poitou. Il y en a aussi abondamment, & de plusieurs especes; dans les fossés qui sont autour de la Haye; & dans ceux de Sorgvliet. Tous ces animaux ont la bouche à une de leurs extrémités; & c'est à la même extrémité que sont aussi leurs bras, ou ce qui leur tient lieu de bras. J'en connois quelques

especes , qui sont sûrement voraces ; En les observant avec une forte loupe , on voit distinctement de petits animaux qui sont attirés dans leur bouche. Il seroit difficile de bien décrire ces Polypes , sans le secours d'un grand nombre de Figures. Leeuwenhoek en a décrit une espeece dans la

* Trans.
Phil.
nomb.
283. art.
4. pag.
1305.

Lettre dont nous avons déjà parlé *. Ils sont représentés fort en grand dans la Planche des Transactions Philosophiques , qui a rapport au nombre que je cite en marge. Figure 8. N W V. & I T S.

A l'occasion de ces différentes especes de Polypes qui peuvent fournir une abondante matiere à découvrir , je ne saurois me dispenser de dire un mot de celle qu'a faite M. Hoghes , Ecclésiastique Anglois. Il a vu dans l'eau d'une grotte de

L'Isle de Barbade, des corps organisés, qu'il a d'abord pris pour des fleurs, mais qu'il a cru ensuite devoir placer dans la classe des animaux. Ayant voulu cueillir ces prétendues fleurs, elles se sont d'abord cachées, comme nous avons dit que le faisoient les Polypes à panache. Elles ont reparu ensuite au bout de quelques minutes, & se sont développées peu à peu. Il paroît par les Observations de M. Hoghes, que les especes de rayons, où plutôt de bras qui bordent le bout antérieur de ces animaux, leur servent à saisir les petits animaux qui nagent dans l'eau. On peut voir dans les Transactions Philosophiques, une plus ample description de ce qu'il a observé sur ce sujet. Il convient de remarquer que M. Hoghes n'avoit au-

cune connoissance de ce qui a été découvert en Europe depuis quelques années sur les Polypes , lorsqu'il a fait les Observations dont il s'agit ici , & que même les siennes ont été faites les premières.

J'AI dit ci-dessus qu'on ignoroit si les Polypes de mer pouvoient se multiplier par la section : j'ajouterai ici qu'il ne paroît pas que cette propriété ait été connue dans aucun animal , au moins par les Naturalistes dont il nous reste quelques Ecrits. Ils ont bien fait mention de divers animaux , dont les morceaux , après avoir été séparés , donnent des marques de vie pendant quelque tems. Aristote dit * , que la plupart des insectes vivent après qu'ils ont été partagés ; mais il ne dit rien qui puisse faire juger qu'il ait observé dans les portions

* Hist.
Animal.
lib. 4.
cap. 7.

de ces animaux aucune reproduction, au moyen de laquelle chacune soit devenue un animal complet. Il paroît seulement qu'il a remarqué que les unes vivoient plus long-tems que les autres. Il rapporte que les animaux qui ont le corps long, & beaucoup de piés, vivent le plus long-tems lorsqu'ils sont partagés; & que les parties marchent après qu'elles ont été séparées, l'une en avant, & l'autre en arriere. Il cite à cette occasion l'exemple des Scolopendres. C'est ce que Saint Augustin rapporte * aussi d'un animal de ce genre, c'est-à-dire, d'une espece de Mille-piés. Celui qu'il a vu, fut même coupé en plusieurs parties, & chacune, dit-il, se mouvoit de maniere, que si nous ne les avions pas séparées nous-mêmes, & si les blessures n'eussent

* Lib. de
quantita-
te Ani-
ma.

pas été visibles , nous les aurions prises pour tout autant d'animaux différens.

IL ne paroît donc pas qu'on ait fait des expériences pour voir ce que deviendroient les morceaux d'animaux en qui il reste du mouvement , après qu'ils ont été séparés. Mais il est certain qu'en divers endroits on a cru que les morceaux de tels ou tels animaux restoient en vie , & même devenoient des animaux parfaits. Ces idées , à la vérité , n'ont gueres passé que pour des préjugés du vulgaire. On a vu dans la Préface du Tome sixieme des Mémoires de M. de Reaumur sur les Insectes * , ce que des Pêcheurs de Normandie avoient remarqué à l'égard des Etoiles de mer , & nous rapporterons bien-tôt ce que des Payfans de Suede ont dit d'un autre animal aquatique , & quel

* Pag.
61. & 62.

DES POLYPES. IV. Mém. 307
jugement on a porté de leur opinion.

ON a vu ci-dessus que des morceaux des Polypes dont il a été question dans ces Mémoires , étant rapprochés les uns des autres , pouvoient se rejoindre , & former un seul animal. C'est ce que Jean-Baptiste Porta dit * des Lézards. Il paroît qu'il a tiré ce passage d'Elie * , qui dit la même chose des Lézards & des Serpens. Cette propriété est encore actuellement attribuée assez généralement à ces mêmes animaux. Je ne saurois dire si cette opinion est fondée sur des observations , ou sur des conjectures. Il n'y a au fond , dans le fait dont il s'agit ici , rien à quoi on n'ait pu être préparé par la connoissance que nous avons d'autres propriétés fort communes aux ani-

* *Phytognomica*. lib. v. cap. 12. edit. Francof.
* *Ælian. Hist. lib. 2. cap. 23.*

maux. L'expérience a appris en bien des occasions , que les parties des animaux pouvoient , lorsqu'elles se touchoient , s'attacher & se réunir aussi facilement que le font celles des plantes. C'est ce que les Medecins & les Chirurgiens ont éprouvé bien des fois à l'égard du corps humain ; & c'est ce qui oblige à prendre des précautions dans le cas où l'on veut empêcher qu'une pareille réunion ne se fasse. Il n'est donc pas étonnant que la même propriété ait lieu dans des Insectes : & s'ils sont de ceux , je ne dis pas seulement dont chaque portion séparée peut devenir un animal complet , &c. mais même de ceux dont les morceaux conservent simplement de la vie pendant quelque tems après leur séparation ; s'ils sont, dis-je , de ces insectes , on n'a

pas lieu d'être surpris , & que les morceaux de ces animaux se réunissent , & qu'ils forment ensuite un animal.

J'AI déjà dit ci-dessus que les anciens faisoient mention de la reproduction des bras des Polypes de mer : j'ajouterai ici , qu'ils parlent encore d'une reproduction qui se fait dans d'autres animaux , savoir , celle de la queue des Lézards & des Serpens. Aristote * & Pline ** assurent qu'elle regroît. C'est ce qui est encore admis assez généralement à présent par rapport aux Lézards. Mais si l'on veut connoître des faits bien prouvés & bien détaillés , sur la reproduction de quelques parties de certains animaux , il faut lire le beau Mémoire de Monsieur de Reaumur , qui renferme les découvertes qu'il a

* Hist.
Animal.
lib. 2.
cap. 17.

** Hist.
Nat. lib.
9. cap.
29.

* Mém. faites à cet égard sur les Ecrevisses *.

de l'Aca-
démie
pour l'an-
née 1712.
Pag. 226.

LES Polypes qui ont fait le sujet de ces Mémoires ayant d'abord été principalement connus par la propriété qu'ils ont de pouvoir être multipliés par la section, il n'est pas étonnant qu'on ait été porté à les regarder comme des Plantes, puisque cette propriété n'étoit connue jusqu'alors que dans des Plantes. On ne pourroit que se confirmer de plus en plus dans cette idée si on les considéroit ensuite par rapport à d'autres propriétés que nous avons fait connoître. En effet, qui ne croiroit que ces Polypes sont des Plantes & non des animaux, si après avoir appris qu'ils peuvent être multipliés par bouture, on entendoit dire qu'ils multiplient naturellement par rejettons, & qu'ils peuvent être greffés ? On ne feroit ;

en les regardant comme Plantes , que suivre des regles généralement reçues sur la nature des Plantes & des animaux : mais à la vérité , en suivant ces mêmes regles , on ne pourroit non plus disconvenir que ces Polypes ne soient des animaux , quand on observeroit leur mouvement progressif , & sur-tout quand on leur verroit saisir des Insectes , les porter à la bouche avec leurs bras , les avaler & les digérer.

MAIS quelle idée devoit-on se faire des Polypes , si l'on ne consultoit que les regles formées sur les propriétés connues jusqu'à présent dans les Plantes & dans les animaux ; quelle idée , dis-je , devoit-on s'en faire en pensant à la propriété qu'ils ont de pouvoir être retournés sans périr , & même sans qu'il se fasse en

aux aucune altération sensible? Comme cette propriété n'est, si je ne me trompe, connue dans aucune Plante ni dans aucun animal, il faudroit donc conclurre qu'à cet égard les Polypes ne sont ni Plante ni animal.

Si donc on s'en tenoit scrupuleusement aux idées qu'on s'est faites assez généralement sur la nature des Plantes & des animaux, il s'en suivroit qu'un Polype, vu les différentes propriétés qu'il renferme, seroit en même-tems Plante & animal, & ne seroit ni animal ni Plante.

On peut juger par-là combien sont peu sûres ces regles prétendues générales dont il est question. Indépendamment de la preuve que les Polypes nous en fournissent, il est facile de sentir que les Plantes & les animaux ne nous sont pas assez con-

nus pour que nous puissions faire des regles générales sur leur nature. Je m'explique à l'égard des animaux.

QUAND je dis qu'ils ne nous sont pas assez connus, j'entens que nous n'en connoissons pas un assez grand nombre, & que ceux qui nous sont connus ne le sont pas assez.

JE crois pouvoir poser ici pour principe, sans rien hasarder, qu'il y a des animaux inconnus, & je demande ensuite si nous pouvons faire des regles générales qui se rapportent à ces animaux inconnus ? Pour le pouvoir, il faudroit être assuré qu'il y a un parfait rapport entre les animaux inconnus & ceux qui nous sont connus : c'est ce qu'on ne sauroit prouver ; & au contraire, la diversité des propriétés qui se trouvent dans les animaux connus semble donner

lieu d'inférer que les animaux inconnus en ont dont nous n'avons encore aucune idée.

JE suppose qu'on n'eût d'abord connu que les animaux qui ne sont sujets à aucune transformation , auroit-on eu raison de dire que les animaux en général ne pouvoient point passer par différens états ? Et auroit-on pu , fondé sur cette règle , lorsqu'on auroit commencé à connoître quelques corps organisés sujets à des transformations ; auroit-on pu , dis-je , décider qu'ils n'étoient pas des animaux , parce qu'ils se transformoient ?

POURQUOI ne se trouveroit-il pas entre les animaux que nous connoissons & les animaux inconnus, des différences aussi grandes , & même plus grandes que celles qu'il y a entre les animaux

DES POLYPTES. IV. Mém. 315
animaux qui se transforment & ceux
qui ne se transforment point ?

IL est d'autant plus raisonnable de
ne pas juger d'une manière absolue
des animaux inconnus par les ani-
maux connus, que le nombre des
premiers l'emporte, selon toutes les
apparences, beaucoup sur celui des
derniers.

NON-SEULEMENT on ne peut pas
faire des règles générales qui se rap-
portent aux animaux inconnus, mais
on est encore fort éloigné d'en pou-
voir faire de sûres à l'égard des ani-
maux connus. La raison en est que
la plupart de ces derniers ne sont
connus que très-superficiellement ;
& que ce seroit aussi précipiter son
jugement que de juger en tout ou en
partie des animaux moins connus par
ceux qui le sont davantage.

Tome II.

X

DES Expériences. qu'on a tous les jours occasion de réitérer, nous apprennent clairement qu'un grand nombre d'animaux, de quadrupedes, par exemple, ne peuvent pas être multipliés par la section : quand on les partage chaque partie meurt. Au lieu de conclurre seulement de ces Expériences que les portions de tels & tels animaux ne pouvoient pas devenir des animaux parfaits, & que selon toutes les apparences, il en étoit de même de celles de plusieurs autres qu'on n'a pas coupés ; au lieu, dis-je, de s'en tenir à cette conséquence particulière, on a fait une règle générale, & on a supposé qu'on ne pouvoit multiplier aucun animal en le coupant : cependant il se trouve que plusieurs animaux connus, & entr'autres les Vers de terre qu'on

a très-souvent occasion de voir , ont cette propriété qui paroissoit incompatible avec la nature d'un animal.

COMBIEN n'y a-t-il , peut-être , pas d'animaux que l'on croit bien connoître qui ont des propriétés aussi extraordinaires que celle-là , & qu'on ne s'attendoit gueres à y trouver ?

IL seroit facile de prouver également que nous ne connoissons pas assez les Plantes pour pouvoir faire des regles générales sur leur nature.

PUISQUE nous sommes encore éloignés de connoître toutes les propriétés dont les Plantes & les animaux sont susceptibles , il n'est pas étonnant que celles qui servent de caractère distinctif à chacune de ces classes de corps organisés ne soient pas fort bien connues.

IL semble d'abord , quand on n'a

pas tâché d'approfondir la nature des Plantes & des animaux , qu'il n'y a rien de plus aisé que de trouver les caracteres qui distinguent les uns des autres : cela vient , si je ne me trompe , de ce qu'on ne juge que sur des idées particulieres , au lieu qu'il s'agit de comparer des idées générales , savoir , l'idée abstraite d'une Plante avec l'idée abstraite d'un animal.

IL est très-facile de distinguer un cheval d'un chêne , & l'on s'accoutume à penser qu'il n'est pas plus difficile de distinguer un animal d'une Plante : ce sont cependant deux choses bien différentes. Il suffit , pour en juger , d'essayer de séparer de l'idée d'un cheval & de celle d'un chêne toutes celles qui sont particulieres à cette espece d'animal & à cette espece de Plante , & de ne garder que

celles qui sont communes à tous les animaux connus & à toutes les Plantes connues. Plus les idées qu'on se formera seront générales , & plus celles des propriétés particulières qui feroient à distinguer un cheval d'un chêne disparaîtront : & plus on approchera de l'idée générale d'un animal & de celle d'une Plante , moins on trouvera de différences entr'elles.

Aussi les Naturalistes qui se sont appliqués à découvrir les caractères distinctifs des Plantes & des animaux ont-ils rencontré de grandes difficultés : ils ont trouvé très-difficile une chose qui paroît très-facile à ceux qui n'ont pas étudié la matière.

On ne peut gueres citer à cette occasion d'autorité plus respectable que celle du célèbre Boerhave. Com-

bien ce grand homme n'avoit-il pas travaillé à étudier les Plantes & les animaux ? Cependant il paroît qu'il n'a trouvé qu'une seule différence générale & essentielle entre ces deux Classes de corps organisés : c'est ce qu'on peut voir au commencement de sa *Chymie* dans les articles où il traite des plantes & des animaux *.

* Pag.
57. &
suiv.
Edit. de
Leyde
1732.

Cette différence consiste dans la manière dont les plantes & les animaux tirent leurs alimens. *Les alimens des plantes*, dit M. Boerhave *, *sont tirés par des racines extérieures, & ceux des animaux par des racines intérieures.* Cette partie extérieure appelée *Racine*, qui tire les alimens du corps dans laquelle elle est placée, distingue assez une plante de tout animal connu jusqu'à présent *.

* Page
64.

* Pag.
37.

Et dans la définition qu'il donne du corps d'un animal, il dit qu'il a en de-

dans des vaisseaux en guise de racines par lesquels il tire la matiere des alimens.* * Page 64.

Ensuite après avoir encore insisté sur la comparaison d'une plante & d'un animal, il ajoute : *C'est en cela que consiste le rapport & la différence qu'il y a entre un végétal & un animal*.* * Page 65.

IL n'est pas inutile de faire remarquer que M. Boerhave ne décide cependant point que la différence dont il s'agit se trouve absolument entre toutes les plantes & les animaux : il se tient dans la réserve , & dit seulement que *cette partie extérieure appelée Racine qui tire les alimens du corps dans lequel elle est placée , distingue assez une plante de tout animal connu jusqu'à présent.*

CE que nous avons dit dans le second Mémoire de la maniere dont les Polypes se nourrissent , prouve

qu'ils sont des animaux , suivant la définition de M. Boerhave. Indépendamment de l'autorité de cet habile homme , je doute qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne les regardent en effet comme tels.

MAIS ce sont des animaux qui ont plus de rapports particuliers avec certaines plantes que quantité d'autres animaux que nous connoissons.

C'EST ce qui pourroit peut-être déterminer à les appeller des Animaux-Plantes : mais je ne sai si l'on peut leur donner ce nom , autrement que par maniere de parler , parce qu'il me paroît qu'on a moins de raisons de prendre les Polypes d'une maniere absolue pour des animaux - plantes que pour de simples animaux. Afin de pouvoir décider que tel corps organisé n'est ni plante ni animal , mais

doit être placé dans une classe mi-toyenne entre les animaux & les plantes, afin, dis-je, de le pòouvoir décider, il faudroit connoître précisément toutes les propriétés dont les plantes & les animaux sont susceptibles. Nous avons vu ci-dessus que nous étions fort éloignés de cette connoissance. Ce n'est que lorsqu'on y sera parvenu qu'on pourra faire d'autres classes de corps organisés. En attendant il est beaucoup plus naturel de regarder les Polypes & divers autres corps organisés qui ont reçu le nom de Zoophytes, comme des animaux qui ont plus de rapports remarquables avec les plantes que d'autres.

Nous n'avons pas cru devoir entreprendre d'expliquer en tout ni en partie les faits singuliers que nous avons rapportés. Il est trop dange-

reux , en fait d'Histoire Naturelle ; d'abandonner l'Expérience pour se laisser conduire à l'imagination. On risque de n'arriver , en suivant cette route , qu'à des hypothèses peu sûres , & qui peuvent devenir nuisibles aux progrès de cette , science si on a le malheur de se prévenir pour elles. Au lieu d'éclaircir les faits par de nouvelles Expériences , on a recours à une hypothèse , disons , à un préjugé qui dispense de la peine d'observer , mais qui ne sert souvent qu'à multiplier nos erreurs.

C'EST ainsi , par exemple , qu'on a cru pendant tant de siècles qu'un grand nombre d'animaux venoient de la corruption des corps dans lesquels ou sur lesquels on les trouvoit. C'est l'origine qu'on a attribuée à tous les Insectes dont on ne connois-

soit pas la maniere de multiplier ; non qu'on ne pût s'en instruire , même avec une attention médiocre : mais le préjugé a aveuglé & empêché qu'on ne pensât à examiner. Dès qu'on s'est défié de ce préjugé , & qu'on a observé , on a vu ces animaux faire des œufs ou des petits comme tant d'autres. Ces faits que les Philosophes n'ont pu voir , ou plutôt que le préjugé ne leur a pas permis de chercher ou de voir , peut-être , quand ils étoient sous leurs yeux ; ces faits , dis-je , peuvent être découverts par des enfans qui se sont amusés pendant quelque tems à observer des Insectes : c'est ce dont j'ai eu le plaisir de faire l'expérience il y a peu de tems.

Il est bien vraisemblable que sans plusieurs préjugés qu'on s'est faits ,

M. Linneus, Professeur en Botanique à Upsal, en rapporte un exemple dans un Programme qui est imprimé à la tête d'un Discours qu'il a fait en 1743. Il dit que des Payfans de la Province de Smaland & d'autres endroits, assurent unanimement touchant le Ver qu'il appelle *Gordius*, que si on le coupe en un grand nombre de parties, chaque morceau conserve son mouvement & reprend une tête, un corps ou une queue, quand on le remet dans l'eau. M. Linneus ajoute ensuite que les Naturalistes aveuglés par les principes qu'ils avoient adoptés, ont regardé ce qu'on disoit de ce Ver comme une fable si ridicule & si contraire à la nature, qu'ils n'ont pas même fait une seule Expérience pour le vérifier.

IL est à remarquer que ce ne sont

que des gens grossiers, & qui ne pouvoient pas être imbus des préjugés de l'Ecole, qui ont cru tout uniment, sur les faits qu'ils ont vus, que des portions d'animaux devenoient des animaux complets.

L'IDE'E dans laquelle on a été qu'aucun animal ne pouvoit être multiplié par bouture, ne paroît propre qu'à faire perdre les occasions de découvrir la propriété qu'on a trouvée aux Polypes lorsqu'on les a coupés : cependant il est arrivé par un hasard assez singulier que cette idée a beaucoup contribué à cette découverte ; car je n'ai entrepris l'Expérience dont elle a été une suite, que parce que j'ai supposé que les morceaux d'un animal ne pouvoient pas devenir des animaux complets ; c'est ce qu'on

peut voir au commencement du premier Mémoire *.

DE's qu'on a sçu que les Polypes * Tome I.
pag. 14.
& suiv. pouvoient être multipliés par la section, on est revenu du préjugé dans lequel on a été si long-tems à cet égard sur la nature des animaux : on a essayé d'en couper de différentes especes, on en a observé les morceaux ; & en peu de tems, comme je l'ai dit ci-dessus *, on a trouvé * Tome I.
pag. 6.
& suiv. plusieurs animaux qui avoient la même propriété que les Polypes.

IL y a lieu de se flater que ces découvertes produiront plusieurs bons effets : elles doivent naturellement nous jeter dans une grande défiance à l'égard de ces regles générales auxquelles, si je puis parler ainsi, on a prétendu borner la nature, & qui ne peuvent servir qu'à mettre

obstacle à nos connoissances ; elles doivent contribuer à nous faire penser que ce que nous connoissons n'est que très-peu de chose en comparaison du nombre prodigieux de merveilles que renferme la nature ; que nous connoissons encore trop peu de parties de ce tout admirable qui est l'ouvrage d'un Etre infini à tous égards ; que nous en connoissons, dis-je , trop peu de parties pour être en état d'expliquer tous les faits qui se présentent à nous.

Nous devons , afin d'étendre nos connoissances sur l'Histoire Naturelle , faire nos efforts pour découvrir le plus de faits qu'il nous sera possible. Si nous connoissions tous les faits que la nature renferme , nous en aurions l'explication , nous verrions le tout qu'ils forment ensemble : plus
nous

nous en connoîtons , plus nous serons en état d'approfondir quelques parties de ce tout. Nous ne pouvons donc mieux travailler à expliquer les faits que nous connoissons , qu'en tâchant d'en découvrir de nouveaux. La nature doit être expliquée par la nature , & non par nos propres vues qui sont trop bornées pour envisager un si grand objet dans toute son étendue. La beauté de la nature paroît certainement davantage , quand ce que nous en connoissons n'est pas mêlé avec nos imaginations : elle nous donne alors des idées plus dignes de la sagesse infinie de son auteur , & par cela même plus propres à former l'esprit & le cœur : c'est ce que nous devons nous proposer dans toutes nos recherches.

EXPLICATION DES FIGURES

DU QUATRIEME MEMOIRE.

P L A N C H E X I.

L Es Figures 1. & 2. représentent les moitiés *ac*, *cb* d'un Polype de la seconde espece, qui a été coupé en deux. La Figure 1. est celle de la premiere partie. *a*, la tête du Polype. *c*, l'endroit où il a été coupé. Ce bout *c*, paroît souvent ouvert, peu après la section. La Figure 2. représente la seconde partie, dont le bout antérieur *c* est ouvert.

ON voit aussi dans la Fig. 3. une seconde partie *cb*, mais dont le bout antérieur *c* est fermé, & un peu renflé.

L A Figure 4. est celle d'une se-

conde partie *cb*. Les bras commencent à paroître au bout antérieur *c*.

LA Figure 5. représente les levres d'un Polype, qui ont été séparées avec des ciseaux du reste du corps. De ces levres sortent les bras du Polype.

LA Figure 6. est celle d'une partie des levres d'un Polype, dont sortent deux bras.

LA Figure 7. représente la moitié *a e i b*, d'un Polype qui a été coupé suivant sa longueur. Cette partie ne s'est pas encore fermée. On voit sa superficie intérieure. Cette moitié de Polype a quatre bras à son extrémité antérieure *a e*.

LA Figure 8. représente une moitié d'un Polype coupé suivant sa longueur, & telle que de pareilles moitiés sont souvent, peu après la

fection. Elles se roulent sur elles-mêmes , en commençant par une de leurs extrémités. Celle qui est représentée ici , a commencé par son bout antérieur. Les bras sont en dedans du rouleau.

LA Figure 9. représente aussi une moitié *aebi*, d'un Polype coupé suivant sa longueur , dont les bords *ai*, *eb*, ont commencé à se rapprocher & à se réunir par le bout postérieur *ib*, & sont déjà réunis jusqu'en *c*. On ne distingue aucune cicatrice à l'endroit où ces bords se sont réunis.

LA Fig. 10. est celle de la même moitié qui est représentée dans la Fig. 9. mais dont les bords sont entièrement réunis. Cette moitié peut dans cet état être déjà regardée comme un Polype entier. On voit deux nou-

veaux bras, qui commencent à pousser dans les intervalles que les vieux laissent entr'eux.

LA Figure 11. est celle d'une Hydre à sept têtes.

ON voit dans la Figure 12. un Polype *ab*, fort contracté & fort renflé, & tel qu'il paroît lorsqu'on le met sur la main hors de l'eau pour le retourner. *c* & *e*, les extrémités d'un ver de Tipule qui sort de la bouche en double, & qui la tient fort ouverte. *bd*, la soie de sanglier dont on se sert pour retourner le Polype, placée de maniere qu'une de ses extrémités *b*, touche le bout postérieur *b* du Polype. C'est lorsque la soie de sanglier est disposée de cette maniere, que l'on commence à pousser le bout *b* du Polype, pour le faire rentrer en dedans en le retournant.

ON voit dans la Figure 13. un Polype ab retourné, placé au bout de la soie de sanglier bd , tel qu'il s'y trouve d'abord après que l'opération est achevée.

LA Figure 14. représente aussi un Polype cab , au bout d'une soie de sanglier bd : mais celui-ci n'est pas entièrement retourné. La portion postérieure ab , ayant été poussée en dedans par la soie de sanglier, s'est retournée, & est sortie dans cet état par la bouche a ; & la portion antérieure ac est restée non retournée.

LA Figure 15. est celle d'un Polype retourné ab , tel que sont ordinairement ceux sur lesquels on a fait cette opération, peu après qu'on leur a fait quitter la soie de sanglier, au bout de laquelle ils se trouvoient.

Leurs levres rentrent d'abord en dedans, & les bras se trouvent réunis comme en un faisceau, plus ou moins ferrés, & paroissent sortir du milieu du bout antérieur du Polype..

LA Figure 16. représente un Polype retourné *ab*, embroché près de la tête *a*, à une soie de sanglier *cd*, nouée en *n*, & placée dans un verre, de maniere qu'elle ne le touche que par ses extrémités, savoir, l'extrémité *d*, le bord *fb*, & l'extrémité *c*, le fond *eg*. Le nœud *n*, est en dessous du Polype *ab*, afin que s'il glisse de *a* en *n*, il soit arrêté par ce nœud *n*, & ne se desembroche pas en glissant jusqu'en *c*.

LA Figure 17. représente un Polype *cab*, déretourné en partie; c'est-à-dire, qu'après avoir été entièrement retourné, comme *ab*, Fig. 15.

338 MEM. POUR L'HISTOIRE
ses levres se sont renversées en de-
hors , & ensuite toute la portion an-
térieure *ac. a* , bouche du Polype ,
avant qu'il fût déretourné en partie.
ac , boutlet , ou portion déretour-
née. *ab* , portion visible de ce qui
est resté retourné. Les bras de ce
Polype sont dirigés vers le bout pos-
térieur *b*.

CEUX du Polype de la Figure 18.
qui représente aussi un Polype dére-
tourné *cab* , sont recourbés vers *c* ,
qui est le nouveau bout antérieur de
ce Polype.

LA Figure 19. représente le même
Polype que la Figure 17. après que
la portion déretournée *ac* , qui se
trouve dans cette dernière Figure
bout à bout avec la portion non dé-
retournée *ab* , s'est inclinée & dis-
posée enfin de manière qu'elle a for-

mé, avec la portion *ab*, Fig. 19. un angle droit *cob. ad, ad*, anciens bras. *an*, partie des anciennes levres du Polype, dont sort une partie des anciens bras. *ao*, nouveaux bras qui commencent à pousser. *aon*, nouvelle bouche, bordée d'un côté, *an*, par les anciens bras, & de l'autre *ao*, par les nouveaux. *ob*, portion retournée. *e*, corps dont je ne connois pas l'origine.

LA Figure 20. représente le même Polype que la Figure 19. mais il est d'un jour plus vieux. *ac*, portion déretournée. *ab*, portion retournée. *e*, corps équivoque. *a*, bouche, marquée *aon* dans la Figure précédente. *ad, ad*, anciens bras. *ai*, nouveaux bras.

LE même Polype se voit dans la Figure 21. mais après avoir mangé,

340 MEM. POUR L'HISTOIRE
crû, & changé de forme d'une ma-
niere assez sensible. *ac*, portion dé-
retournée. *ab*, portion retournée. *e*,
corps équivoque. De *a* en *t* on voit
le reste des anciens bras, ceux qui
n'ont pas servi à border la nouvelle
bouche *a*, qui s'est formée.

ON voit encore le même Polype
dans la Figure 22. mais plus grand,
& plus vieux. *ac*, portion déretour-
née. *ab*, portion retournée. *e*, corps
équivoque. *u*, bouche qui s'est for-
mée sans que je m'en sois aperçu.
a, bouche marquée *aon* dans la Fi-
gure 19.

LA Figure 23. est encore celle du
même Polype : mais il est dans une
attitude fort différente de celle qui
est représentée dans les deux précé-
dentes Figures, & il a plusieurs jeu-
nes. *ac*, portion déretournée. *ab*,

portion retournée. *c*, corps équivoque, dont sont sortis deux jeunes Polypes coniques. *k*, autre Polype conique, qui est sorti de la portion *ac*. *a*, bouche marquée *aon* dans la Figure 19. *u*, bouche marquée *u* dans la Figure 22.

P L A N C H E X I I.

LA Figure 1. représente un Polype déretourné en partie. *ac*, portion déretournée. *ab*, partie postérieure du Polype qui est restée retournée. *ei*, jeune qui s'est trouvé dans l'estomac du Polype d'abord après qu'il a été retourné, mais qui en est sorti par l'ouverture faite à la peau de la mere en coupant un autre jeune qui sortoit aussi de son corps.

ON voit dans la Figure 2. le même Polype qui est représenté dans la

premiere, mais après qu'il s'est fait en lui un changement assez considerable. *ac*, portion déretournée. *eb*, portion qui est restée retournée. *ei*, jeune qui est enté sur la portion retournée *eb*.

LA Figure 3. représente le même Polype, tel qu'il étoit quatre jours après avoir été tel qu'il est représenté dans la Figure précédente. *ac*, portion déretournée, sur le côté de laquelle on voit une partie des bras qu'avoit le Polype avant que d'avoir été retourné. *eb*, portion retournée. *ei*, jeune.

LA Figure 4. représente un Polype, déretourné en partie. *ab*, portion postérieure du Polype qui est restée retournée. *adcege*, portion déretournée, dans laquelle il s'est fait déjà un changement considéra-

ble; il s'est formé trois têtes *d, g, e*.

LA Figure 5. représente le même Polype de la Figure 4. mais plus vieux de quatorze jours. *ab*, portion qui est restée retournée. *adcngeeo*, portion déretournée. *ad, ng, ne*, les trois têtes avec leurs cols; elles sont marquées *d, g, e*, dans la Figure précédente.

LA Figure 6. est celle du même Polype, tel qu'il étoit treize jours après avoir été dans l'état représenté dans la Figure 5. La portion *oc* de cette Figure 5. s'est partagée de *o* en *c*, & les deux portions *bacdo*, & *engceo*, Figure 6. n'ont plus été attachées l'une à l'autre que par un petit appendice *o*. *ab*, portion qui est restée retournée. *ac, oc*, deux portions qui, dans la Figure précédente, sont marquées réunies en *oc*. *ad*,

ng, *ne*, les trois têtes avec un col, marquées dans la Figure 5. par les mêmes lettres.

Les deux portions qui ne tiennent dans la Figure 6. que par l'appendice *o*, sont vues séparées dans les Figures 7. & 8. *ab*, Figure 7. portion retournée. *ad*, une des têtes. *ng*, *ne*, Figure 8. les deux autres têtes.

LA Figure 9. représente deux Polypes, dont l'un est mis dans l'autre. *ab*, Polype extérieur. *cabd*, Polype intérieur. *nf*, soie de porc qui transperce en *e* ces deux Polypes.

LA Figure 10. est celle des mêmes Polypes. *aib*, Polype extérieur. *caid*, Polype intérieur, dont la portion *id* a fendu celle *ib* du Polype extérieur, & en est sortie par ce moyen. *nf*, soie de sanglier, qui

transperce ces deux Polypes.

ON voit dans la Figure 11. les mêmes Polypes : mais la portion *id* du Polype intérieur a fendu davantage la portion *ib* du Polype extérieur, & en est sortie jusques au-delà de l'endroit *e*, où entroit la soie de porc *nf*, qui transperçoit d'abord les deux Polypes ensemble, mais qui, lorsqu'ils étoient dans l'état représenté dans cette Figure, transperçoit d'abord l'intérieur, & ensuite l'extérieur. *aib*, Polype extérieur. *caid*, Polype intérieur. *nf*, soie de sanglier qui transperce ces deux Polypes.

LA Figure 12. représente les deux Polypes, après que l'intérieur ayant fendu les levres de l'extérieur, a achevé de sortir de ce Polype. *aeb*, Polype extérieur. *ced*, Polype inté-

rieur. *nf*, soie de porc qui les transperce.

LA Figure 13. représente deux autres Polypes, mis l'un dans l'autre. *ab*, Polype extérieur. *bd*, extrémité postérieure du Polype intérieur. Tout le reste de son corps est caché dans celui du Polype extérieur, excepté cinq bras *ao, ao, ao, ao, ao*, qui sortent par la bouche *a* de ce dernier. *nf*, soie de sanglier, qui transperce les deux Polypes.

LA Figure 14. représente les mêmes Polypes. *ted*, Polype intérieur. *to, to, to, to, to*, bras du Polype intérieur, qui sont sortis par une ouverture qui étoit en *t. nf*, soie de porc qui transperce ces Polypes.

LA Figure 15. est encore celle des deux Polypes de la Figure 13. *atb*, Polype extérieur. *ted*, Polype intérieur.

neur. *to, to*, deux bras du Polype intérieur, qui sortent par l'ouverture *z. eo*, bras du même Polype.

P L A N C H E XIII.

LA Figure 1. représente deux Polypes, mis l'un dans l'autre. *ab*, Polype extérieur. *cabd*, Polype intérieur.

ON voit les mêmes Polypes dans la Figure 2. mais la portion *id* du Polype intérieur, est sortie du Polype extérieur en fendant sa portion *ib*. *aib*, Polype extérieur. *caid*, Polype intérieur.

LA Figure 3. représente les Polypes de la Figure 2. mais après qu'ils ont mangé : c'est le Polype intérieur qui a avalé un ver par sa bouche *c*. Ce Ver a ensuite rempli toutes les parties des deux Polypes, & les a obli-

gés à s'enfler. *aib*, Polype extérieur.
coid, Polype intérieur.

LA Figure 4. représente les mêmes Polypes, mais après que la portion *ca* du Polype intérieur, Figure 2. a fendu les levres du Polype extérieur, & s'est située de la maniere qu'elle est représentée dans la Figure 4. où *co* marque la portion désignée dans la Figure 2. par les lettres *ca*. *aib*, Polype extérieur. *coid*, Polype intérieur.

LA Figure 5. représente les Polypes de la Figure 4. mais renflés par les alimens qui ont été introduits dans leurs estomacs par la bouche *a* du Polype extérieur, & qui se sont répandus dans *aib* Polype extérieur, & dans *coid*, Polype intérieur enté sur l'autre.

CES Polypes ont grandi & multi-

plié, après avoir mangé à diverses reprises. La Figure 6. les représente. *aib*, Polype extérieur. *coid*, Polype intérieur. *e, e, e, e*, jeunes Polypes.

LES mêmes Polypes sont encore représentés dans la Figure 7. La portion *co* du Polype intérieur, est fort étranglée en *n*. *aib*, Polype extérieur. *cnoïd*, Polype intérieur.

LA Figure 8. représente la portion *cn* de la Figure 7. qui s'est séparée du reste en *n*.

ON voit dans la Figure 9. le reste des deux Polypes. *aib*, Polype extérieur. *on*, reste de la portion *cno*, Figure 7. du Polype intérieur. *id*, portion postérieure du Polype intérieur.

LA Figure 10. représente un Polype dans lequel j'ai mis un autre Poly-

pe. La tête du Polype intérieur s'est réunie avec celle du Polype extérieur. Ces deux têtes se sont ensuite confondues, de manière qu'elles n'étoient plus reconnoissables que par deux rangs de bras qui étoient l'un au dessus de l'autre.

LA Figure 11. est celle de la moitié d'un Polype que j'ai déchiré en le retournant : je lui ai après cela donné encore quelques coups de ciseaux. Au bout de deux mois, elle s'est trouvée telle qu'on la voit représentée dans cette Figure.

LA Figure 12. représente deux moitiés de Polypes qui ont été séparés, & qui sont déjà un peu réunis, *ac*, première partie. *cb*, seconde partie. *c*, endroit où elles se sont réunies, qui est fort étranglé.

LA Figure 13. représente les mê-

E D'UNE ECHELLE

S ETRES NATURELS.

L'HOMME.

Orang-Outang.

Singe.

QUADRUPÈDES

Bitumes.

TERRES.

Terre pure.

EAU.

AIR.

FEU.

Matieres plus subtil





différence de reproduction n'est pas

é l
n'a

téc

I

I

I

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{4}$

$\frac{1}{5}$

I


IV

po en masse. De ce bout int

on qui
X x.



seaux que les



DES POLYPES. IV. Mém. 351
mes moitiés de Polypes que la précédente, mais elles sont remplies d'alimens. *ac*, premiere partie. *cb*, seconde partie. *c*, endroit où elles se sont réunies, qui est fort étranglé.

Fin du quatrieme & dernier Mémoire.

A P P R O B A T I O N.

J'AI lu par ordre de Monseigneur le Chancelier, un ouvrage intitulé : *Mémoires pour l'Histoire des Polypes*, par M. Trembley, & il m'a paru que tout y caractérise un Observateur également intelligent & attentif, & que les recherches qu'ils contiennent, répondent à la réputation que l'Auteur s'est acquise dans la République des Lettres, & sont très-dignes de la curiosité du Public. Fait à Paris le 18. Septembre 1744.

BRUHIER.

A 1 1456391

PRIVILEGE DU ROI.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra : SALUT. Notre bien amé LAURENT DURAND, Libraire à Paris, Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public des Ouvrages qui ont pour titre : *Mémoires pour servir à l'Histoire d'un genre de Polypes d'eau douce, par M. Trembley, de la Société Royale de Londres; Principes pour la lecture des Poëtes*, s'il Nous plaisoit de lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. Aces causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons, de faire imprimer lesdits Ouvrages, en un ou plusieurs Volumes, & autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre, faire vendre, & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de neuf années consécutives, à compter du jour de la date desdites Présentes. Faisons défenses à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres personnes,

d'imprimer , faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire lefd. Ouvrages , ni d'en faire aucun extrait sous quelque prétexte que ce soit , d'augmentation , correction , changemens ou autres , sans le consentement exprès & par écrit dudit Exposant , ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits , & de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans , dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre tiers audit Exposant , ou à celui qui aura droit de lui , & de tous dépens , dommages & intérêts ; à la charge que cesdites Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume , & non ailleurs , en bon papier & beaux caractères , conformément à la feuille imprimée , attachée pour modèle sous le contrescel desdites Présentes ; que l'Impétrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie , & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant de les exposer en vente , les Manuscrits qui auront servi de copie à l'impression desd. Ouvrages , seront remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée , ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau Chancelier de France , Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en sera ensuite remis

deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château du Louvre , & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau Chancelier de France ; le tout à peine de nullité des Présentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans cause , pleinement & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desd. Ouvrages , soit tenue pour dûment signifiée ; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés , féaux Conseillers & Secrétaires , foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires , sans demander autre permission , & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le douzième jour du mois d'Octobre , l'an de grace mil sept cent quarante-quatre ; & de notre règne le trentième. Par le Roi en son Conseil.

SAINSON.

Registré sur le Registre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris , N°. 370. fol. 312. conformément aux anciens Reglemens , confirmés par celui du 28. Fevrier 1723. A Paris le 30. Octobre 1744.

VINCENT, Syndic.

Fig. 3.



Fig. 1.



Fig. 6.



Fig. 4.



Fig. 9.



8.



Fig. 7.



Fig. 11.



Fig. 10.





Fig. 1.



Fig. 6.



Fig. 3.



Fig. 2.



Fig. 4.



100
100
100
100
100



Fig. 8.



Fig. 7.



Fig. 10.



Fig. 9.




Fig. 12.




Fig. u.



Fig.



Fig. 13.





Fig. 4.



Fig. 3.



Fig. 2.



Fig. 6.



Fig. 5.



Fig. 1.



Fig. 7.



Fig. 9.




Fig. 11.



Fig. 13.







[illegible]

27th Nov



5

